

REGIONE LIGURIA

**DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO**

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

COLTURE FLORICOLE E ORNAMENTALI

FEBBRAIO 2023

INDICE GENERALE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. SCELTA DELL'AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITA'**
- 3. MANTENIMENTO DELL'AGROSISTEMA NATURALE**
- 4. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE**
- 5. SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALL'IMPIANTO E ALLA SEMINA**
- 6. SUCCESSIONE COLTURALE**
- 7. SEMINA, TRAPIANTO E IMPIANTO**
- 8. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI**
- 9. GESTIONE DELL'ALBERO (PER FLORICOLE ARBOREE)**
- 10. FERTILIZZAZIONE**
 - 10.1. CORRETTIVI**
 - 10.2. BIODISTIMOLANTI E CORROBORANTI**
- 11. IRRIGAZIONE**
- 12. ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI**
 - 12.1. COLTURE FUORI SUOLO**
 - 12.2. COLTURE PROTETTE**
 - 12.3. COLTURE IN VASO**
- 13. RACCOLTA**
 - ALLEGATO N° 1: ISTRUZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DEI TERRENI E L'INTERPRETAZIONE DELLE ANALISI**
 - ALLEGATO N° 2: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE**
 - ALLEGATO N° 3: SCHEDE-COLTURA**
 - ALLEGATO N° 4: SCHEDE DI FERTILIZZAZIONE CON IL METODO DELLA "DOSE STANDARD"**
 - ALLEGATO N° 5: DIFESA FITOSANITARIA: NORME COMUNI A TUTTE LE COLTURE E MODALITA' DI LETTURA DELLE SCHEDE DI DIFESA E CONTROLLO INFESTANTI DELLE COLTURE**
 - ALLEGATO N° 6: SCHEDE-DIFESA**
 - ALLEGATO N° 7: SCHEDE- CONTROLLO INFESTANTI**
 - ALLEGATO N° 8: MACCHINE DISTRIBUTTRICI DI PRODOTTI FITOSANITARI, IMPIEGO DPI E SMALTIMENTO CONFEZIONI**
 - ALLEGATO N° 9: AVVERSITA' FLORICOLE**

1. Introduzione

Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Al fine di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente naturale con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e di innalzare il livello di salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori, si definiscono i criteri generali in materia di tecniche agronomiche, come base di riferimento per la predisposizione dei disciplinari regionali e i relativi piani di controllo.

Il presente disciplinare ha lo scopo di fornire le indicazioni tecniche (agronomiche e di difesa) necessarie a definire gli obblighi e gli impegni cui devono sottostare le aziende agricole che, su base volontaria, aderiscono al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e alla misura 10.1.A del PSR "Adesione ai principi dell'agricoltura integrata".

Il disciplinare è stato redatto sulla base delle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata 2023 consultabili sul sito della rete rurale nazionale (<http://www.reterurale.it>).

Il disciplinare comprende una **parte generale** di descrizione delle azioni raccomandate e obbligatorie relative alle tecniche colturali e di difesa e una parte di dettaglio per ogni coltura costituita da **schede tecniche allegate così distinte**:

- **scheda-coltura**, che riporta indicazioni sulla vocazionalità ambientale e pedologica della singola coltura o buone pratiche di gestione agronomica;
- **scheda di concimazione**, che indica la "dose standard" dei principali elementi nutritivi;
- **scheda di difesa**, con le indicazioni e gli obblighi relativi all'uso di prodotti fitosanitari;
- **scheda di controllo infestanti (schede di diserbo)**, con le indicazioni e gli obblighi relativi al controllo degli infestanti.

Non per tutte le colture sono presenti tutte le quattro tipologie di scheda.

Le prescrizioni contenute all'interno delle caselle di testo con sfondo grigio (come questa) sono da considerarsi obbligatorie e vincolanti.

La Regione Liguria può concedere deroghe temporanee alle norme tecniche dei disciplinari solo in caso di eventi eccezionali. Tali deroghe devono essere richieste dagli interessati, aziende singole o associate, e devono essere debitamente motivate. Se la problematica coinvolge ampi territori la Regione può concedere deroghe di valenza territoriale.

Il presente disciplinare si occupa di tutti i prodotti fitosanitari impiegati in azienda eccezion fatta per i trattamenti post-raccolta.

2. Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità

Sebbene la scelta di un sito idoneo, qualunque sia la specie agraria che si intenda coltivare, rappresenti un elemento decisivo per la riuscita tecnico-economica della coltivazione, non si ritiene opportuno porre dei limiti alla diffusione delle diverse colture in quanto la variabilità del materiale genetico a disposizione del produttore è quasi sempre tale da consentire un'ampia adattabilità alle diverse condizioni ambientali. Il limite della vocazione di un terreno, sia generale che specifica, per una data coltura è infatti, sempre più spesso, posto soltanto dalla convenienza economica alla sua coltivazione.

Il produttore deve valutare l'idoneità e la vocazionalità dell'area di coltivazione sulla base delle informazioni relative alle caratteristiche ambientali e pedologiche disponibili ed eventualmente effettuando analisi specifiche. A tale scopo è utile fare riferimento anche alle indicazioni riportate nelle schede-coltura.

3. Mantenimento dell'agroecosistema naturale

La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e più di altre contribuisce a ridurre l'uso delle sostanze chimiche di sintesi, salvaguardando i principali organismi utili al contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali e a rispettare l'agroecosistema naturale. Per preservare e rafforzare tale patrimonio è possibile adottare tecniche agronomiche ed eseguire interventi nei diversi agroecosistemi, quali per esempio il ripristino e la realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari ecc.

Le aziende aderenti al sistema della produzione integrata possono effettuare le scelte di maggiore interesse rispetto alle specifiche caratteristiche produttive/ambientali.

Non è ammessa la bruciatura delle stoppie.

4. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Varietà ed ecotipi devono essere scelti in funzione delle condizioni pedoclimatiche in modo da favorire il massimo adattamento e, quindi, limitare l'impiego di energia e mezzi chimici. Non si pongono, comunque, vincoli nella scelta delle cultivar, essendo presente un'intensa attività di miglioramento genetico che dà luogo ad un rapido rinnovamento varietale. Sono da preferire le varietà resistenti e/o tolleranti alle principali fitopatie, tenendo conto delle esigenze di mercato dei prodotti ottenibili.

Il materiale di propagazione deve essere sano, garantito dal punto di vista genetico e deve offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica. Non è consentito l'uso di materiale da organismi geneticamente modificati (OGM).

Per le colture arboree, ove disponibile, si deve ricorrere a materiale d'impianto di categoria "certificato". In assenza di tale materiale potrà essere impiegato materiale di categoria CAC.

Per le colture erbacee da pieno campo si deve ricorrere a semente certificata.

Per le colture arboree tutti i materiali di propagazione devono essere accompagnati dal relativo "Passaporto delle piante" (Reg. UE 2016/2031 e relativi regolamenti di attuazione).

Fatta salva la normativa fitosanitaria vigente, l'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo nel caso in cui l'azienda utilizzi:

- risorse genetiche vegetali inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o registro regionale delle risorse genetiche autoctone,
- ecotipi specificatamente elencati,
- varietà in conservazione iscritte nel registro nazionale.

Lo scambio e la vendita di semente tra agricoltori sono consentiti solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto/trapianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado e

vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell'area. Devono inoltre contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso. A questo scopo dovrebbero essere utilizzati, se disponibili, gli strumenti cartografici in campo pedologico.

Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al successivo capitolo della fertilizzazione.

Quando la preparazione del suolo comporta tecniche di lavorazione di particolare rilievo sull'agroambiente naturale come lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati geologici, le rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere attentamente valutate oltre che nel rispetto del territorio anche della fertilità al fine di individuare gli eventuali interventi ammendanti e correttivi necessari.

Per colture poliennali (es. rosa, fronde verdi) nel caso dell'impianto le lavorazioni hanno lo scopo di arieggiare il terreno in profondità e incorporare negli strati più profondi eventuali apporti di sostanza organica, correttivi e fertilizzanti fosfo-potassici. E' ammessa la possibilità di effettuare lo scavo localizzato per la messa a dimora delle piante.

La scelta del tipo di apprestamento protettivo rappresenta un momento determinante al fine di impostare un equilibrato schema produttivo e ottenere rese soddisfacenti. La calibrazione dell'apprestamento deve tenere conto delle esigenze produttive delle specie dominanti in azienda e delle loro eventuali patologie, che trovano in un'opportuna (per la pianta) situazione microclimatica il primo e più importante mezzo di contenimento.

Si raccomanda di costruire serre e impianti il più possibile rispettosi dell'ambiente, anche per quel che riguarda il risparmio energetico, e di prevedere la regolare manutenzione di tutti gli impianti. A questo proposito si veda anche il paragrafo 12.1 "Colture protette". E' ammessa l'utilizzazione di serre con strutture e rapporti volumetrici di vario tipo, nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli apprestamenti protettivi e i relativi impianti interni (elettrico, riscaldamento, irrigazione etc.) devono rispettare norme e vincoli nazionali e locali (*vedi anche le norme vincolanti al paragrafo 8 "Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti"*).

6. Successione colturale

La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni. Nonostante la pratica dell'avvicendamento sia sicuramente raccomandabile anche per le colture floricole, data la loro specificità, le modeste dimensioni aziendali presenti in Liguria e la possibilità di coltivare in vaso o su bancale, sono stati individuati gli **obblighi** riportati in seguito:

- le colture protette prodotte all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità;
- per le colture floricole pluriennali è necessario un intervallo minimo di almeno un anno, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore;
- per le colture floricole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell'ambito della stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento.
- le colture floricole poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali.

Qualora nella singola scheda colturale sia presente una norma più restrittiva, quest'ultima diviene vincolante.

7. Semina, trapianto, impianto

Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) per le colture annuali devono consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario delle colture, limitando l'impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando l'uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico.

Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate. Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche

sostenibili, devono poter limitare l'utilizzo di fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare e/o pigmentare le produzioni vegetali.

8. Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate al miglioramento delle condizioni di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati produttivi, favorire il controllo delle infestanti, migliorare l'efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti, preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione. Per la disinfezione pre-impianto del terreno sono da preferire mezzi rispettosi dell'ambiente (mezzi fisici quali solarizzazione, vapore, ecc). La fumigazione con prodotti chimici è consentita solo nei casi e alle condizioni specificate nelle schede di difesa.

In generale l'azienda deve comunque sottostare ai seguenti **obblighi**:

- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite, per le colture erbacee, esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione; per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argilloso, franco-argilloso e franco-sabbioso-argilloso (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'epicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione;
- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni;
- sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila delle colture a portamento arboreo sono ammessi solo interventi localizzati di interrimento sulla fila dei concimi a ridotto impatto ambientale (es. organo-minerali, concimi a lenta cessione);
- nelle colture arboree le operazioni di semina e interrimento del sovescio sono ammissibili sia in pianura, sia nelle situazioni con pendenze medie dal 10% al 30%; in quest'ultimo caso, tuttavia, il sovescio andrà eseguito a filari alterni. Nel caso di terrazzamenti si fa riferimento alla pendenza dell'appezzamento coltivabile.

I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti sono disciplinati negli allegati specifici riportati più avanti.

Nel caso si preveda il ricorso alla pacciamatura è raccomandato l'impiego di materiali biodegradabili compostabili compresi film plastici derivanti da risorse naturali rinnovabili, che consentono di ottenere un buon effetto pacciamante e di essere incorporati nel suolo a fine ciclo evitando la necessità di rimozione e smaltimento.

9. Gestione dell'albero e della fruttificazione

Le cure destinate alle colture arboree quali patate, piegature e altre pratiche quali l'impollinazione e il diradamento devono essere praticate con le finalità di favorire un corretto equilibrio delle esigenze qualitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura; tali modalità di gestione devono puntare a ridurre il più possibile l'impiego di fitoregolatori. L'eventuale loro impiego dovrà essere previsto nelle norme tecniche delle singole colture secondo quanto stabilito in allegato 8.

10. Fertilizzazione

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione delle successioni secondo quanto stabilito al punto 6, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.

In sintesi l'azienda deve sottostare ai seguenti **obblighi**:

- disporre delle **analisi del terreno** degli appezzamenti condotti secondo le norme del presente disciplinare, effettuate con le modalità e i criteri descritti nell'allegato 1. Le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto è necessario averle disponibili prima della stesura del piano stesso. Per le colture erbacee è necessario eseguire l'analisi del terreno almeno ogni 5 anni, per le colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. E' comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che si dispone dei risultati delle analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata. E' richiesta l'effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea del punto di vista pedologico e agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo). Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l'inizio dell'impegno. L'analisi chimico-fisica del terreno deve contenere almeno le informazioni relative alla granulometria, al pH, alla CSC, e per le situazioni dove la sua conoscenza è ritenuta necessaria per la corretta interpretazione delle analisi, alla sostanza organica, al calcare totale e attivo, all'azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile;

Per le aree omogenee che differiscono solo per tipologia colturale (seminativo, orticole, arboree) e che hanno superfici inferiori a:

- - 5000 mq per le colture arboree
- - 10.000 mq per le colture erbacee

Non sono obbligatorie le analisi del suolo e in questi casi per la predisposizione del piano di fertilizzazione si assumono come riferimento i livelli di dotazione in macroelementi elevati.

- Per le colture floricole, in particolare quelle protette, è raccomandata l'esecuzione dell'analisi chimica dei principali elementi della fertilità (azoto, fosforo e potassio) anche con maggiore frequenza rispetto ai criteri riportati in allegato 1. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, né la stesura del piano di fertilizzazione e tale indicazione va riportata nelle note del registro delle operazioni di produzione per l'annata agraria in corso specificando la coltura non fertilizzata.
- Nel caso di doppie colture (principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura ripetuti (es. orticole e ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo colturale.
- Provvedere alla definizione dei quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale adottando uno specifico **piano di fertilizzazione analitico** oppure, per le colture previste in allegato 4, **standard** cioè calcolato con il metodo della "Dose Standard".
- Il **Piano di fertilizzazione analitico** deve essere redatto da un tecnico qualificato sulla base di una serie di valutazioni tra le quali rientrano: le asportazioni, le disponibilità di macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, l'avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione. Un corretto piano di fertilizzazione indica anche le epoche di distribuzione più adatte che devono comunque rispettare i vincoli temporali definiti nelle singole schede-coltura (allegato n° 3).
- Inoltre il piano di fertilizzazione per coltura deve essere riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale nell'ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di sintesi). I fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della produzione ordinaria attesa o stimata (dati ISTAT o medie delle annate precedenti per la zona in

esame o per zone analoghe) e devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio. Nella determinazione dei nutrienti occorre applicare il criterio di evitare di apportare al sistema terreno-pianta attraverso le concimazioni, quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, pur maggiorandoli delle possibili perdite e fatti salvi i casi di scarse dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle indagini analitiche. L'apporto di microelementi non viene normato. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame si precisa che eventuali apporti concorrono al raggiungimento del limite previsto per i prodotti fitosanitari. Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Per i dettagli sull'interpretazione dell'analisi chimica del suolo e sulle modalità di calcolo dei fabbisogni si rimanda agli allegati n. 1 e 2.

- L'uso agronomico di fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti non è ammesso, ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare.
- L'impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:
 - dati identificativi degli appezzamenti,
 - caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi,
 - individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista,
 - fertilizzanti impiegabili
 - modalità ed epoche di distribuzione.
- Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle "note" del registro delle operazioni di produzione, per l'annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.
- Nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura ripetuti (es. orticole o floricole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo colturale. Nel calcolo occorre tenere conto delle sole asportazioni e precessioni colturali, ma non dei parametri di dilavamento o altri aspetti che hanno valenza solo per la coltura principale.
- In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le schede a **"dose standard"** elaborate per coltura. La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in condizioni ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche. La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate all'interno della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si prevedono:
 - una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard,
 - scarsa dotazione di sostanza organica,
 - casi di scarsa vigoria,
 - dilavamento da forti piogge invernali o anche in periodi diversi,
 - casi di cultivar tardive ecc...

Diversamente si eseguono delle riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di minore produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria), si apportano ammendanti, eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo, elevato tenore di sostanza organica ecc. Le schede dose standard sono contenute nell'allegato 4.

Nelle aree definite "vulnerabili ai nitrati di origine agricola" devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni derivanti dai programmi d'azione obbligatori di cui all'art.92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991.

- L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare.
- In ogni caso per le colture floricole e ornamentali coltivate in terra, per tutto l'arco dell'anno, non si devono superare le seguenti quantità per ettaro: 450 kg di azoto, 350 kg di P₂O₅ e 600 kg di K₂O.
- Per quanto riguarda i seguenti argomenti:
 - impiego dei fertilizzanti contenenti azoto (epoche e modalità di distribuzione e frazionamento)
 - efficienza dell'azoto apportato con i fertilizzanti (per concimi di sintesi, effluenti zootecnici, ammendanti organici)
 - fertilizzazione di fondo con fosforo e potassio (modalità e apporti massimi)
 - fertilizzazione organica (caratteristiche chimiche di letami, materiali palabili e liquami, epoche e modalità di distribuzione, apporti massimi)

si faccia riferimento alle istruzioni riportate negli omonimi paragrafi dell'allegato numero 2 "Istruzioni per la compilazione del piano di concimazione aziendale" anche nel caso in cui gli apporti massimi degli elementi fertilizzanti vengano calcolati utilizzando il metodo della "dose standard".

Si raccomanda l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione (v. allegato 2). Si ricorda che sono impiegabili anche i prodotti consentiti dal Regolamento Europeo relativo ai metodi di produzione biologica.

10.1 Correttivi

Il D. lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii. definisce correttivi "i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio". Il medesimo D. Lgs. stabilisce anche le diverse tipologie di prodotti che possono essere immessi sul mercato, riportati nella tabella sottostante.

I correttivi possono essere di origine minerale (estrattiva) oppure dei sottoprodotti di attività umane spesso non direttamente connesse all'agricoltura; la sostenibilità e la compatibilità del loro impiego in agricoltura non può esulare da una analisi più ampia che prenda in considerazione:

una preliminare analisi del terreno di destinazione, per verificare l'effettiva necessità di correzione del pH, in funzione della coltura ospitata dal terreno stesso;

le caratteristiche analitiche del correttivo scelto, poiché esso può apportare quote significative di sostanza organica, azoto e fosforo, da considerare nel piano di concimazione delle colture e da conteggiare rispetto ai massimali di azoto al campo previsti;

l'assistenza di un tecnico o di un agronomo per valutare le analisi sopra indicate e definire innanzitutto l'utilità o meno dell'uso del correttivo, nonché le dosi, l'epoca e la modalità di distribuzione in campo.

È comunque vietato l'utilizzo di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.

Principali correttivi in base al D. lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii.

| Denominazione | Componenti essenziali | Titolo minimo e/o sostanze utili | Elementi e/o sostanze utili da dichiarare |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Correttivo calcareo | Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio | 35% CaO | CaO totale Classe granulometrica |
| Marna | Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso | 25% CaO | CaO totale Classe granulometrica |
| Correttivo calcareo-magnesiaco | Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonato di calcio e di magnesio | 35% CaO + MgO 8% MgO | CaO totale MgO totale Classe granulometrica |
| Dolomite | Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio | 40% CaO + MgO 17% MgO | CaO totale MgO totale Classe granulometrica |
| Calce agricola viva | Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componente essenziale ossido di calcio | 70% CaO | CaO totale Classe granulometrica |
| Calce agricola spenta | Prodotto ottenuto per idratazione della calce agricola viva | 50% CaO | CaO totale Classe granulometrica |
| Calce viva magnesiaca | Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree magnesiache | 70% CaO + MgO | CaO totale MgO totale Classe granulometrica |
| Calce spenta magnesiaca | Prodotto ottenuto per idratazione della calce viva magnesiaca | 50% CaO + MgO 12% MgO | CaO totale MgO totale Classe granulometrica |

| Denominazione | Componenti essenziali | Titolo minimo e/o sostanze utili | Elementi e/o sostanze utili da dichiarare |
|---|---|---|--|
| Ceneri di calce | Prodotto residuo della fabbricazione delle calci. Può contenere ossidi, idrossidi, carbonati di calcio e di magnesio e ceneri di carbone | 40% CaO + MgO | CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa) |
| Ceneri di calce magnesiaca | Prodotto residuo della fabbricazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8% | 40% CaO + MgO 8% MgO | CaO totale MgO totale Classe granulometrica |
| Calce di defecazione | Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso | CaO 20% | CaO totale Classe granulometrica |
| Gesso agricolo | Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua | 25% CaO 35% SO ₃ | CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica |
| Anidrite | Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro | 30% CaO 45% SO ₃ | CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica |
| Gesso cotto | Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso | 30% CaO 45% SO ₃ | CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica |
| Solfato di calcio precipitato | Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acido fosforico | 25% CaO 35% SO ₃ | CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica |
| Sospensione di calcare | Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso | 20% CaO | CaO totale |
| Solfato di magnesio per uso agricolo | Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come espomite e kieserite | 15% MgO solubile 30% SO ₃ solubile | MgO solubile SO ₃ solubile |
| Ossido di magnesio | Prodotto polverulento ottenuto per calcinazione di rocce magnesiache e contenente come componente essenziale ossido di magnesio | 30% MgO | MgO totale |
| Soluzione di cloruro di calcio | Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione di cloruro di calcio in acqua | 12% CaO solubile in acqua | CaO solubile in acqua |
| Soluzioni miste di sali di calcio e di magnesio | Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione in acqua di composti solubili di Ca e Mg | Totale 10% CaO + MgO solubili in acqua, di cui: 4% CaO solubile in acqua 1% MgO solubile in acqua | CaO solubile in acqua MgO solubile in acqua |
| Gessi di defecazione | Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio. Non sono ammessi fanghi di depurazione | CaO: 20% sul secco SO ₃ : 15% sul secco | CaO totale SO ₃ totale È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato |

| Denominazione | Componenti essenziali | Titolo minimo e/o sostanze utili | Elementi e/o sostanze utili da dichiarare |
|------------------------------------|--|--|---|
| | | | (esempio: tessuti animali) |
| Carbonato di calcio di defecazione | Prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica. Non sono ammessi fanghi di depurazione | CaO: 28% sul secco | CaO totale È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali) |
| Gesso di defecazione fanghi | Prodotto ottenuto per idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione di solfato di calcio | CaO: 15% sul secco SO3: 10% sul secco | CaO totale SO3 totale N tot |

Fonte: Dlgs. n.75/2010 - Allegato3

10.2 Biostimolanti e corroboranti

L'utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e nutrizionale delle colture. Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente protetta dall'insorgere di fisiopatie e dall'attacco di fitopatologie; l'opportunità di disporre di mezzi tecnici innovativi, in grado di migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno strumento indiretto al fine di indurre una maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed abiotici nella difesa integrata.

In tale contesto si inseriscono:

- i biostimolanti, che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti da parte della coltura;
- i corroboranti, che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne potenziano la naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente di tipo fisico-meccanico. L'elenco dei prodotti corroboranti utilizzabili è riportato nella tabella seguente.

Prodotti impiegabili come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali (come da Allegato 2 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018 inerente le disposizioni per l'attuazione del Regolamento Europeo relativo alla produzione biologica).

| Denominazione del prodotto | Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale | Modalità e precauzioni d'uso |
|---|--|-------------------------------|
| PROPOLIS | È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito | |
| POLVERE DI PIETRA O DI ROCCIA | Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. | Esente da elementi inquinanti |
| BICARBONATO DI SODIO | Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo. | |
| GEL DI SILICE | Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari | |
| PREPARATI BIODINAMICI | Preparazioni previste dal regolamento Europeo relativo alla produzione biologica. | |
| OLI VEGETALI ALIMENTARI (Arachide, Cartamo, | Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo | |

| | | |
|---|--|---|
| Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Di Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa (*), borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca) | produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua, E' ammesso l'impiego del polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. (*) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22/05/2009. | |
| LECITINA | Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15% | |
| ACETO | Di vino e frutta | |
| SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA | Utilizzabile unicamente tal quale | |
| CALCE VIVA | Utilizzabile unicamente tal quale | |
| ESTRATTO INTEGRALE DI CASTAGNO A BASE DI TANNINO | Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini. | |
| SOLUZIONE ACQUOSA DI ACIDO ASCORBICO | Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%. | Il prodotto è usato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici. |
| OLIO VEGETALE TRATTATO CON OZONO | Prodotto derivante dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole) | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |
| ESTRATTO GLICOLICO A BASE DI FLAVONOIDI | Prodotto derivato dall'estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante. | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |

11. Irrigazione

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. A questo proposito le aziende devono disporre dei dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali. I volumi di irrigazione dovrebbero essere determinati in relazione a un bilancio idrico che tenga conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione.

In relazione alle esigenze dell'azienda i piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando sia supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici basati anche su informazioni fornite da servizi di assistenza tecnica pubblica o privata) sia strumenti tecnologici (ad es. termometri, pluviometri, tensiometri ecc.). Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.

In generale è vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento.

Negli impianti arborei già in essere e nelle colture erbacee l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le seguenti prescrizioni:

1. Il volume massimo per intervento è quello necessario a fare sì che la lama d'acqua raggiunga i $\frac{3}{4}$ di un appezzamento, dopo di che si dovrà sospendere l'erogazione dell'acqua poiché la restante parte del campo sarà bagnata per scorrimento della lama di acqua.
2. Il tempo intercorrente tra una irrigazione e l'altra, verrà calcolato tenendo conto del valore di restituzione idrica del periodo e delle piogge.

Per i nuovi impianti di colture arboree, realizzati successivamente alla data di adesione, è vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento ad eccezione di quelli alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura.

L'impiego di acqua in funzione di antibrina non è da calcolare come intervento irriguo. I volumi di irrigazione devono essere determinati in relazione ad un bilancio idrico che tenga conto delle fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. In relazione alle esigenze dell'azienda i piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando sia supporti aziendali specialistici (es. schede irrigue, programmi informatici), sia strumenti tecnologici (ad es. stazioni agrometeorologiche, pluviometri, tensiometri, ecc).

Per le aziende che non elaborano un piano di irrigazione è comunque obbligatorio rispettare almeno i volumi massimi di adacquamento di riferimento per ciascun intervento in funzione del tipo di terreno e la registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate e dei dati di pioggia; tali vincoli valgono anche nei casi di forniture irrigue non continue.

In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento: le registrazioni di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia non sono obbligatorie. Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.

È opportuno verificare la qualità delle acque utilizzate per l'irrigazione, evitando l'impiego sia di acque saline, sia di acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti. Si raccomanda quindi l'esecuzione periodica dell'analisi chimica dell'acqua irrigua, eseguita secondo i metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico descritti nel D.M. del 23 marzo 2000 (Supplemento Ordinario alla G.U. n° 87 del 13 aprile 2000), atta a valutarne l'idoneità all'uso irriguo.

La gestione dell'irrigazione può essere attuata adottando uno dei metodi di seguito proposti in relazione alle proprie esigenze e alla disponibilità di strumenti tecnologici.

Metodo 1 – Metodo “base” vincolante:

Per ciascuna coltura l'azienda deve registrare sulle apposite schede irrigue:

1) data e volume di irrigazione e tipologia di distribuzione:

- se si utilizza l'irrigazione per aspersione e per scorrimento: data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento; per le sole aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha può essere indicato il volume di irrigazione distribuito per l'intero ciclo colturale prevedendo in questo caso l'indicazione delle date di inizio e fine irrigazione;
- se si utilizza la micro portata di erogazione: volume di irrigazione stagionale, numero delle adacquate e data di inizio e fine stagione irrigua
- .
- in caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono essere forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.

2) dato di pioggia:

- ricavabile da pluviometro o da stazione meteorologica pubblica e/o privata. Sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con superficie inferiore a 1 ettaro e quelle dotate di impianti a di micro portata. La registrazione della data e del volume di irrigazione e del dato di pioggia non è obbligatoria per le colture non irrigate; mentre per i casi di irrigazione di soccorso, giustificati dalle condizioni climatiche, dovrà essere indicato il volume impiegato. I dati di pioggia delle capannine della rete OMIRL (Osservatorio Meteo-Idrologico Regione Liguria) possono essere scaricati da internet all'indirizzo <https://ambientepub.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp> oppure si può consultare il Bollettino Agrometeo della Regione Liguria redatto dal CAAR (Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale), disponibile sul sito <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/agrometeo-caar/bollettino-agrometeo-caar.html>

3) volume di adacquamento:

- l'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno desunto dalla tabella contenuta nelle note tecniche di coltura. In assenza di specifiche indicazioni, i volumi massimi ammessi sono:

| Tipo di terreno | MICRO PORTATA | | ASPERSIONE | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------|
| | Millimetri | Metri cubi ad ettaro | Millimetri | Metri cubi ad ettaro |
| Terreno sciolto | 15 | 150 | 35 | 350 |
| Terreno medio impasto | 20 | 200 | 45 | 450 |
| Terreno argilloso | 25 | 250 | 55 | 550 |

2 METODI AVANZATI:**Metodo 2.1 – Metodo delle schede irrigue**

L'agricoltore opera utilizzando le tabelle di coltura, presenti nei disciplinari, necessarie per la definizione dell'epoca e del volume irriguo d'intervento. Ogni azienda deve registrare sulle apposite schede irrigue le date e i volumi di irrigazione utilizzati per ogni intervento. Nel solo caso di irrigazione turnata si può prescindere dal vincolo di registrazione della data di inizio irrigazione con un anticipo massimo di 5 giorni.

Analogamente sempre in caso di irrigazione turnata, il volume distribuito potrà superare il consumo cumulato della coltura a quella data tenendo conto dell'impossibilità di irrigare fino al turno successivo, il volume eventualmente distribuito in eccesso (che dovrà comunque essere inferiore a quello massimo d'intervento) dovrà essere considerato ai fini dei bilanci successivi.

Nel caso di aziende che utilizzano impianti a micro portata devono essere registrate le sole date del primo e dell'ultimo intervento, il numero delle adacquate e il volume complessivo distribuito per ogni ciclo colturale.

Metodo 2.2 – Metodo dei supporti informatici

Questo metodo è utilizzabile dalle aziende che dispongono di DSS- sistemi di supporto alle decisioni oppure per le colture per cui questo tipo di servizio è reso disponibile dalla Regione Liguria e indicato sui bollettini.

L'azienda deve avere la possibilità di accedere ad internet e deve collegarsi alle pagine web che vengono indicate (con un link) sui Bollettini Regionali. In tali pagine l'agricoltore trova le indicazioni relative ai volumi di irrigazione in relazione al tipo di terreno e alla zona di ubicazione dell'appezzamento, deve seguire le indicazioni riportate in merito alle epoche di distribuzione e non deve utilizzare, per ogni intervento irriguo, volumi che eccedano quelli indicati. L'azienda non ha l'obbligo di registrare i dati di pioggia poiché il servizio è basato sui dati di pioggia dei Servizi meteo ufficiali, ma deve stampare e conservare la pagina web dedicata al servizio con riportata la data e il volume irriguo consigliati. Tali stampe vanno conservate per il controllo, assieme alla registrazione sulle schede irrigue della data e del volume di irrigazione erogato.

Metodo 2.3 Metodo dei supporti aziendali specialistici

L'agricoltore utilizza appositi strumenti per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno, quali:

- tensiometri per i soli impianti a micro portata (goccia e spruzzo),
- watermark per impianti a micro portata e a pioggia,
- altri sensori per il rilievo dell'umidità del terreno,

abbinati all'impiego di sistemi di supporto alle decisioni (DSS).

Ove disponibili nei Bollettini regionali (agrometeorologici e di produzione integrata) l'azienda deve seguire le indicazioni relative alle date di inizio e fine irrigazione ed eventuali ulteriori indicazioni.

Ogni azienda deve registrare sulle apposite schede la data, il volume di irrigazione e dati di campo rilevati. In questo caso non è richiesta la documentazione del dato di pioggia. Per ciascun intervento irriguo non si possono in ogni caso superare i volumi massimi ammessi per i tipi di terreno riportati nella precedente tabella. Nel caso di impianti a micro portata devono essere registrate le sole date del primo e dell'ultimo intervento, il numero delle adacquate e il volume complessivo distribuito per ciclo colturale. Per quanto riguarda l'uso di altri strumenti, tipo tensiometri, è necessario registrare il valore rilevato in corrispondenza dei singoli adacquamenti.

In alternativa stampare i file di log che il DSS prevede, le informazioni irrigue e le registrazioni delle irrigazioni effettuate. In questo caso non è richiesta la documentazione del dato di pioggia.

12. Altri metodi di produzione e aspetti particolari**12.1 Colture fuori suolo:**

È ammessa l'applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione agronomica delle acque reflue.

Scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento

Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che devono essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti:

- costituzione,
- struttura,
- capacità di ritenzione idrica,
- potere assorbente,
- pH,
- contenuto in elementi nutritivi e EC,
- potere isolante,
- sanità
- facilità di reperimento e costi

Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici. Esaurita la propria funzione, i substrati naturali possono essere utilizzati come ammendanti su altre colture presenti in azienda.

I substrati sintetici devono essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme. È necessario verificare, tramite i dati riportati dal produttore in etichetta o tramite l'analisi chimico-fisica, le caratteristiche chimico-fisiche del substrato per poter calibrare la concimazione (v. anche i vincoli per le colture in vaso al paragrafo 8), e si consiglia di monitorare periodicamente lo stato nutrizionale delle coltivazioni tramite l'analisi chimico-fisica del substrato. Il nome commerciale dei substrati deve essere registrato nella scheda di magazzino. Il certificato d'analisi del substrato (emesso dal fornitore o analizzato in laboratorio) contenente la sua composizione chimica deve essere conservato insieme agli altri documenti inerenti il magazzino.

Fertirrigazione

Nella tecnica di produzione nel fuorisuolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di:

- soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura,
- apporto degli elementi fertilizzanti;
- dilavamento del substrato (percolato)

La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione della specie coltivata e della naturale presenza di sali disciolti nell'acqua. Viene misurata attraverso la conducibilità elettrica utilizzando come unità di misura il siemens (millisiemens o microsiemens). Per ogni coltura vi sono dei valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di fitotossicità.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia indicativi riferiti ad alcune colture:

| EC | Pomodoro | Peperone | Cetriolo | Melone | Zucchino | Melanzana | Fagiolo | Fragola | Vivaio | Taglio |
|----|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| mS | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 1.60* | 2.40 | 3.30 |

dati ricavati da "Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuorisuolo" edito da Veneto Agricoltura

(*) in Trentino il valore soglia utilizzato per la fragola è di 1.90 mS

Gestione delle acque reflue (percolato)

Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e dal dilavamento del substrato, qualora si riutilizzi l'anno successivo, hanno ancora un contenuto in elementi fertilizzanti significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono essere ancora utilizzate ai fini nutrizionali:

- nel riciclaggio interno sulla coltura previa verifica della idoneità dal punto di vista fitosanitario, sottoponendole se necessario a filtrazione, clorazione, trattamento con UV;
- mediante distribuzione dell'acqua di drenaggio per il mantenimento del tappeto erboso della serra, se presente. La presenza del tappeto erboso sotto la coltura fuori suolo garantisce una azione climatizzante sottochioma e favorisce lo sviluppo di insetti/acari antagonisti;
- per la fertilizzazione di altre colture.

12.2 Colture protette

Ai fini del presente disciplinare, per "serre" e "colture protette" si intende quanto definito al comma 27 dell'articolo 3 del L 309/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.11.2009:

"«Serra»: ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento esterno solitamente traslucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Sono quindi considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è traslucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia). Non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta: le colture coperte, ma non chiuse, come ad esempio quelle con coperture antipioggia."

I combustibili ammessi per il riscaldamento delle colture protette sono esclusivamente il metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, i combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale. Sono ammessi inoltre tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche).

12.3 Colture in vaso

12.3.1 Gestione del substrato

Per le colture in vaso è fondamentale la scelta del substrato che deve tenere conto del tipo di coltura e gestione, solitamente sono da preferire materiali ad elevata capacità di ritenzione idrica. Le caratteristiche fisiche ottimali del substrato (dopo irrigazione e drenaggio) per molte colture possono essere le seguenti (% espresse in volume):

- porosità totale: 50-85%
- spazio per l'aria: 10-30%
- capacità del vaso: 45-65%
- acqua disponibile: 25-35%
- acqua non disponibile: 25-35%
- densità apparente: 0.19-0.70 g/cc

Bisogna tenere sempre presente che un substrato con un'elevata proporzione di particelle grossolane ha molto spazio per l'aria e relativamente poca capacità di ritenzione idrica e conseguentemente è facile avere perdite di nutrienti. E' necessario verificare, tramite i dati riportati dal produttore in etichetta o tramite l'analisi chimico-fisica, le caratteristiche chimico-fisiche del substrato per poter calibrare la concimazione (v. anche i vincoli per le colture in vaso al paragrafo 8), e si consiglia di monitorare periodicamente lo stato nutrizionale delle coltivazioni tramite l'analisi chimico-fisica del substrato con maggiore frequenza nel periodo estivo, registrando almeno l'andamento della conducibilità elettrica, in quanto la distribuzione di molti fertilizzanti comporta un aumento di questo parametro. Il livello ottimale di conducibilità nel substrato (estratto a saturazione) per la maggior parte delle piante è compreso tra 1 e 2,5: mS/cm. E' utile anche conoscere l'acqua irrigua utilizzata, che dovrebbe avere la conducibilità inferiore a 0,75 mS/cm ed essere acidificata nel caso di pH elevato.

12.3.2 Fertilizzazione

Per le coltivazioni in vaso oltre alle disposizioni riportate in seguito, è opportuno considerare anche le indicazioni emerse dai risultati dell'attività del progetto SEGIF (<http://www.rivierafiori.net/progetto-segif/>) "Sviluppo di un sistema Esperto per la Gestione dell'Irrigazione, Fertilizzazione e controllo fitopatologico in floricoltura" finanziato ai sensi del Reg. Ce 1698/2005 Misura 124 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria (DGR n°1176/2011):

- Per le peculiarità del metodo di coltivazione in vaso **non si fa obbligo di definire i quantitativi massimi** di elementi nutritivi attraverso un piano di coltivazione o l'uso di specifiche schede a "dose standard", così come previsto per le coltivazioni in piena terra.
- Devono essere utilizzati substrati di cui siano note le principali caratteristiche fisico-chimiche, registrando la denominazione commerciale e i dati analitici riportati in etichetta oppure facendo eseguire l'analisi chimico-fisica del substrato/terriccio, al fine di verificarne l'idoneità alla coltura e minimizzare l'impiego e la perdita di nutrienti nell'acqua di drenaggio.
- La fertirrigazione è consentita se praticata mediante sistemi irrigui che prevedono la distribuzione localizzata. La fertirrigazione per aspersione "a pioggia" è consentita soltanto se abbinata a sistemi che consentono di recuperare l'acqua in eccesso.
- La distribuzione localizzata e frazionata di concime a cessione controllata deve avvenire con i seguenti accorgimenti d'uso:
 - distribuire il prodotto ad una dose non superiore a quanto riportato in etichetta;
 - utilizzare, in autunno e in inverno, dosi dimezzate rispetto a quelle applicabili nel periodo estivo,
 - non utilizzare i concimi sulla superficie del vaso nel caso di contenitori soggetti al rovesciamento,
 - nel caso di fertilizzazione "di fondo" pre-trapianto miscelare uniformemente il concime con il substrato,
 - non distribuire a spaglio il concime sopra i vasi già posizionati,
 - tenere presente che possono esserci perdite di nutrienti in relazione al sistema irriguo utilizzato.

Si ricorda che sono disponibili in commercio anche vasi in materiali plastici biodegradabili derivanti da risorse naturali rinnovabili il cui impiego è raccomandato in quanto contribuisce alla sostenibilità ambientale e può essere opportunamente valorizzato in determinati mercati particolarmente sensibili a questa tematica.

L'impiego di fertilizzanti a lenta cessione o cessione controllata è raccomandato. E' raccomandata una concimazione "di fondo" al momento della preparazione del substrato poichè ciò contribuisce a eliminare o diminuire considerevolmente l'impiego di concimi idrosolubili nei periodi successivi. E' sempre consigliato, al fine di ottimizzare gli interventi, di raggruppare le colture in gruppi omogenei di esigenze nutrizionali (specie, età, ecc.). Si raccomanda, ove applicabile, l'uso di un sistema di fertirrigazione localizzato a basso volume direttamente in vaso, verificando il volume irriguo in modo tale da limitare il drenaggio e la perdita di nutrienti.

12.3.3 Irrigazione

Per le coltivazioni in serra sono raccomandate tutte le soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei volumi irrigui, al recupero e riutilizzo delle acque (es. irrigazione localizzata, bancali flusso e riflusso, sistemi di recupero degli scarichi) e al recupero e utilizzo delle acque piovane che rappresentano una fonte aggiuntiva di acqua di alta qualità irrigua che può essere utilizzata per miscelare acque poco idonee o far fronte a deficit stagionali.

Nel caso di coltivazioni in vaso, anche in pieno campo, è raccomandato l'uso di teli multistrato con feltro assorbente da posizionare sul terreno livellato e su cui appoggiare i vasi: questa tipologia di telo consente notevoli risparmi irrigui ed evita dispersioni di nutrienti nel suolo.

Nelle **coltivazioni in vaso** il momento in cui si prepara l'area di sistemazione dei vasi è quello maggiormente esposto all'erosione superficiale, che comporta trasporto solido con possibile occlusione delle reti di scolo. Gli accorgimenti che bisogna adottare sono:

- limitare il periodo di "suolo nudo", specie in stagioni piovose stabilizzando il terreno e adottando sistemi di copertura del suolo;
- prevedere sistemi di protezione nelle zone non coltivate;
- mantenere efficiente la rete scolante onde evitare eccessi di velocità di scorrimento e a tal fine si consigliano i canali di scolo inerbiti che uniscono alla riduzione della velocità di scorrimento un'attività di "biofiltrazione" in grado di diminuire il carico dei nutrienti;
- costruire percorsi e gradoni antierosione.

E' raccomandato l'uso di sistemi di irrigazione localizzati a basso volume direttamente in vaso, verificandone il volume irriguo in modo da limitare al massimo il drenaggio. In tal caso e, particolarmente se si utilizza ancora un sistema di irrigazione a pioggia, è necessario agire in modo tale da minimizzare la dispersione e il percolamento di acqua durante le operazioni irrigue, pertanto si consiglia:

- di effettuare una distribuzione di acqua frazionata nell'arco della giornata rispetto ad un unico apporto giornaliero,
- di dosare gli apporti in base alla capacità di ritenzione e allo stato di bagnatura del substrato,
- l'utilizzo di teli multistrato assorbenti per la subirrigazione dei vasi,
- di ottimizzare la spaziatura dei vasi,
- di verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'impianto irriguo.

Nelle **coltivazioni in vaso in serra** si raccomanda di:

- prevedere forme di recupero a ciclo chiuso e riutilizzo dei reflui, ad es. con l'uso di sistemi di subirrigazione e ricircolo,
- controllare almeno due volte l'anno, in estate e in inverno, la qualità dell'acqua irrigua, in quanto l'uso di acqua non adatta può provocare alterazione del pH del substrato e occlusioni di ugelli per "mist" o micro portata,
- utilizzare teli multistrato assorbenti per la subirrigazione dei vasi,
- ottimizzare la spaziatura dei vasi, la creazione di bacini di accumulo allo scopo di evitare che le acque di scarico derivanti dall'attività irrigua escano dall'azienda e per raccogliere le acque piovane da utilizzare quale fonte aggiuntiva per l'irrigazione.

In qualche caso sono consigliabili (es. per Ruscus e Pittosporo) impianti di irrigazione suppletiva soprachioma che permettono di controllare meglio lo stress idrico in piante più sensibili, con una riduzione degli apporti d'acqua direttamente al terreno che potrebbero provocare fenomeni di asfissia radicale.

13. Raccolta

La raccolta dei prodotti deve avvenire nel momento ottimale (maturità commerciale diversificata per le diverse specie) nel rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari utilizzati. È opportuno che gli operatori dediti a queste operazioni siano formati e informati sui rischi che le operazioni di raccolta possono arrecare. Gli imballaggi primari devono garantire la sicurezza igienico-sanitaria.

I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive diverse.

Allegato n° 1.**ISTRUZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DEI TERRENI E L'INTERPRETAZIONE DELLE ANALISI****Analisi del terreno**

Le analisi fisico-chimiche costituiscono un importante strumento per una migliore conoscenza delle caratteristiche del terreno e bisogna quindi effettuare opportune analisi di laboratorio valutando i parametri e seguendo le metodologie più avanti specificate.

In generale, si valuta che le analisi possano conservare la loro validità per un periodo massimo di 5 anni scaduto il quale occorre procedere, per la formulazione del piano di fertilizzazione, a nuove determinazioni.

Basandosi su questo principio è ammesso, quando si aderisce ai disciplinari di produzione integrata, di utilizzare le analisi eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in pre impianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni. Successivamente a tale prima verifica i risultati analitici possono conservare la loro validità per l'intera durata dell'impianto arboreo.

I parametri richiesti nell'analisi sono almeno: granulometria (tessitura), pH in acqua, sostanza organica, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile e la capacità di scambio cationico (CSC) per quelle situazioni dove questo parametro è ritenuto necessario per una corretta interpretazione delle analisi.

Se per i terreni in oggetto sono disponibili carte pedologiche o di fertilità i parametri analitici da valutare si possono sostituire o ridurre in parte.

Fatto salvo quanto previsto per le colture arboree, dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, CSC) non sono richieste nuove determinazioni. Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest'ultimo valore andrà nuovamente determinato.

Nel caso di colture ortive o floricole le determinazioni analitiche devono prevedere anche la conduttività e devono essere ripetute ogni tre anni. Nel caso in cui non siano previsti apporti di fertilizzanti non è neppure richiesta l'esecuzione delle analisi. Le determinazioni e l'espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e pubblicati sul suppl. ord. della G.U. n. 248 del 21/10/99) o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale. In questo caso i disciplinari dovranno contenere le relative tabelle di interpretazione dei risultati analitici

Sul referto dell'analisi è utile riportare gli estremi catastali o le coordinate geografiche dell'appezzamento in cui è stato effettuato il prelievo.

Per determinate colture, in particolare per le colture arboree, l'analisi fogliare o altre tecniche equivalenti (come ad esempio l'uso dello "SPAD" per stimare il contenuto di clorofilla) possono essere utilizzate come strumenti complementari. Tali tecniche sono utili per stabilire lo stato nutrizionale della pianta e per evidenziare eventuali carenze o squilibri di elementi minerali.

In caso di disponibilità di indici affidabili per la loro interpretazione, i dati derivati dall'analisi delle foglie o dalle tecniche equivalenti, possono essere utilizzati per impostare meglio il piano di concimazione.

Epoca di campionamento

Deve essere scelta in funzione dello stato del terreno, che non dovrà essere né troppo secco né troppo umido. È opportuno intervenire in un momento sufficientemente lontano dagli interventi di lavorazione e di fertilizzazione; per le colture erbacee l'epoca ottimale coincide con i giorni successivi alla raccolta, oppure almeno due mesi dopo l'ultimo apporto di concime.

Modalità di campionamento:**Individuazione dell'unità di campionamento**

La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno dipende da un corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz'altro la provenienza da un'area omogenea dal punto di vista pedologico e agronomico, intesa sia in termini di avvicendamento che di pratiche colturali di rilievo. È necessario pertanto individuare correttamente l'unità di campionamento che coincide con

l'area omogenea, ossia la superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per pratiche colturali comuni (irrigazione, profondità di lavorazione, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti) i terreni abbiano caratteristiche chimico fisiche simili. Per ciascuna area omogenea individuata deve essere effettuato almeno un campionamento.

L'operatore associato che opera in regime di qualità SQNPI, nel caso in cui abbia curato da almeno 5 anni la predisposizione e l'attuazione del piano di fertilizzazione presso le aziende degli associati, può individuare l'area omogenea anche oltre i confini aziendali, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti.

Si consiglia di delineare le ripartizioni individuate in tal senso in azienda utilizzando copie dei fogli di mappa catastali o, se disponibili, di Carte Tecniche Regionali.

Qualora si disponga della cartografia pedologica, la zona di campionamento deve comunque ricadere all'interno di una sola unità pedologica.

Prelievo del campione

Al fine di ottenere un campione rappresentativo, il prelevamento per le colture erbacee deve essere eseguito come segue:

- procedendo a zig zag nell'appezzamento, si devono individuare, a seconda dell'estensione, fino a 20 punti di prelievo di campioni elementari;
- nei punti segnati, dopo aver asportato e allontanato i primi 5 cm al fine di eliminare la cortica erbosa e gli eventuali detriti superficiali presenti, si effettua il prelievo fino ad una profondità di 30 cm;
- si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso ed allontanato pietre e materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere, ecc.), si prende dal miscuglio circa 1 kg di terra da portare al laboratorio di analisi.

Nei casi di terreni investiti a colture arboree o destinati allo scasso per l'impianto di tali colture, si consiglia di prelevare separatamente il campione di "soprassuolo" (topsoil) e quello di "sottosuolo" (subsoil). Il soprassuolo si preleva secondo le norme già descritte per le colture erbacee (cioè fino a 30 cm), il sottosuolo si preleva scendendo fino a 60 cm di profondità. Se il campione viene effettuato con coltura arborea in atto è possibile preparare un unico campione tra 0 e 50 cm.

I campioni di terreno prelevati devono:

- essere posti in sacchetti impermeabili mai usati;
- essere muniti di etichetta di identificazione posta all'esterno dell'involucro, con l'indicazione per le colture arboree se trattasi di campioni da 0 a 30 cm o da 30 a 60 cm di profondità (i due campioni vanno posti in due sacchetti separati). Per maggiori informazioni è possibile scaricare la guida al campionamento al seguente link <http://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/laboratorio-analisi-terreni-e-produzioni-vegetali.html>


Caratteristiche del terreno

Tessitura o granulometria

La tessitura o granulometria del terreno fornisce un'indicazione sulle dimensioni e sulla quantità delle particelle che lo costituiscono. La struttura, cioè l'organizzazione di questi aggregati nel terreno, condiziona in maniera particolare la macro e la microporosità, quindi l'aerazione e la capacità di ritenzione idrica del suolo, da cui dipendono tutte le attività biologiche del terreno e il grado di lisciviazione del profilo pedogenetico.

Per interpretare i risultati relativi a sabbia, limo ed argilla, si consiglia di utilizzare il triangolo granulometrico proposto dall'USDA e di seguito riportato con le frazioni così definite:

- sabbia: particelle con diametro tra 0,05 e 2 mm;
- limo: particelle con diametro tra 0,002 e 0,05 mm;
- argilla: particelle con diametro minore di 0,002 mm.



| Legenda | Codice | Descrizione | Raggruppamento |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | S | Sabbioso | Tendenzialmente Sabbioso |
| 2 | SF | Sabbioso Franco | |
| 3 | L | Limoso | Franco |
| 4 | FS | Franco Sabbioso | Tendenzialmente Sabbioso |
| 5 | F | Franco | Franco |
| 6 | FL | Franco Limoso | |
| 7 | FSA | Franco Sabbioso Argilloso | |
| 8 | FA | Franco Argilloso | |
| 9 | FLA | Franco Limoso Argilloso | Tendenzialmente Argilloso |
| 10 | AS | Argilloso Sabbioso | Tendenzialmente Argilloso |
| 11 | AL | Argilloso Limoso | |
| 12 | A | Argilloso | |

Reazione del terreno (pH in acqua)

Indica la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante nel terreno; il suo valore dà un'indicazione sulla disponibilità di molti macro e microelementi ad essere assorbiti. Il pH influisce sull'attività microbiologica (ad es. i batteri azotofissatori e nitrificanti prediligono pH subacidi-subalcalini, gli attinomiceti prediligono pH neutri-subalcalini) e sulla disponibilità di elementi minerali, in quanto ne condiziona la solubilità e quindi l'accumulo o la lisciviazione.

| Valori | Classificazione |
|---------|----------------------|
| < 5,4 | fortemente acido |
| 5,4-6,0 | acido |
| 6,1-6,7 | leggermente acido |
| 6,8-7,3 | neutro |
| 7,4-8,1 | leggermente alcalino |
| 8,2-8,6 | alcalino |
| > 8,6 | fortemente alcalino |

Fonte SILPA

Capacità di scambio cationico (CSC)

Esprime la capacità del suolo di trattenere sulle fasi solide, ed in forma reversibile, una certa quantità di cationi, in modo particolare calcio, magnesio, potassio e sodio.

La CSC è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica, per cui più risultano elevati questi parametri e maggiore sarà il valore della CSC. Un valore troppo elevato della CSC può evidenziare condizioni che rendono non disponibili per le colture alcuni elementi quali potassio, calcio, magnesio. Viceversa un valore troppo basso è indice di condizioni che rendono possibili perdite per dilavamento degli elementi nutritivi. E' necessario quindi tenere conto di questo parametro nella formulazione dei piani di concimazione, ad esempio prevedendo apporti frazionati di fertilizzanti nei suoli con una bassa CSC.

Pertanto una buona CSC garantisce la presenza nel suolo di un pool di elementi nutritivi conservati in forma labile e dunque disponibile per la nutrizione vegetale.

| Capacità Scambio Cationico (meq/100 g) | |
|---|---------|
| < 10 | Bassa |
| 10-20 | Media |
| > 20 | Elevata |

Fonte SILPA

Conducibilità elettrica

E' una misura che risulta strettamente correlata al livello di salinità del terreno e si determina effettuando estratti acquosi secondo rapporti predefiniti tra terra fine e acqua (es. 1:2 o 1:5) o saturando completamente il suolo con acqua (estratto a saturazione). E' evidente che l'interpretazione va riferita al metodo utilizzato.

Es. utilizzando il rapporto suolo:acqua=1:5, valori inferiori ai 250µS/cm in genere non destano preoccupazioni mentre sono sicuramente problematici valori superiori ai 600-700 µS/cm, che dovranno indurre ad ulteriori indagini ad esempio eseguendo la determinazione sull'estratto a saturazione (o pasta satura), che dà indicazioni più precise e interpretabili sullo stato di salinità del suolo e verificando anche la qualità dell'acqua irrigua.

Valori di conducibilità espressi sull'estratto a saturazione inferiori a 2000-2500 µS/cm in genere non creano problemi alle colture, sebbene esiste una marcata differenza nel tollerare la salinità tra le diverse specie vegetali; mentre con valori superiori ai 4000 µS/cm si hanno perdite di produzione o sintomi già evidenti in molte specie.

Sostanza organica

Rappresenta circa l'1-3 % della fase solida in peso e il 12-15% in volume; ciò significa che essa costituisce una grossa parte delle superfici attive del suolo e, quindi, ha un ruolo fondamentale sia per la nutrizione delle piante (mineralizzazione e rilascio degli elementi nutritivi, sostentamento dei microrganismi, trasporto di P e dei microelementi alle radici, formazione del complesso di scambio dei nutrienti) e sia per la struttura del terreno (aerazione, aumento della capacità di ritenzione idrica nei suoli sabbiosi, limitazione nella formazione di strati impermeabili nei suoli limosi, limitazione, compattamento ed erosione nei suoli argillosi); spesso i terreni agricoli ne sono deficitari.

Comunemente il contenuto in sostanza organica viene stimato indirettamente moltiplicando la concentrazione di carbonio organico per un coefficiente di conversione pari a 1,724.

| Giudizio | Dotazione di Sostanza organica (%) | | |
|-----------------|---|--|---|
| | Terreni sabbiosi (S-SF-FS) | Terreni medio impasto (F-FL-FA-FSA) | Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS-L) |
| basso | <0,8 | < 1,0 | < 1,2 |
| normale | 0,8 – 2,0 | 1,0 – 2,5 | 1,2 – 3,0 |
| elevato | > 2,0 | > 2,5 | > 3,0 |

Fonte: elaborazione GTA

Calcare

Si analizza come "calcare totale" e "calcare attivo".

Per calcare totale si intende la componente minerale costituita prevalentemente da carbonati di calcio e in misura minore di magnesio e sodio.

Se presente nella giusta quantità il calcare è un importante costituente del terreno, in grado di neutralizzare l'eventuale acidità e di fornire calcio e magnesio. Entro certi limiti agisce positivamente sulla struttura del terreno, sulla nutrizione dei vegetali e sulla mineralizzazione della sostanza organica; se presente in eccesso

inibisce l'assorbimento del ferro e del fosforo rendendoli insolubili e innalza il pH del suolo portandolo all'alcalinizzazione.

Il calcare attivo, in particolare, è la frazione del calcare totale facilmente solubile nella soluzione circolante e, quindi, quella che maggiormente interagisce con la fisiologia dell'apparato radicale e l'assorbimento di diversi elementi minerali. Per la maggior parte delle piante agrarie, un elevato contenuto di calcare attivo ha l'effetto di deprimere, per insolubilizzazione, l'assorbimento di molti macro e micro-elementi (come fosforo, ferro, boro e manganese).

| Calcare totale (g/Kg) | | Calcare attivo (g/Kg) | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| <10 | Non calcareo | <10 | Bassa |
| 10-100 | Poco calcareo | 10-50 | Media |
| 101-250 | Mediamente calcareo | 51- 75 | Elevata |
| 251-500 | Calcareo | > 75 | Molto elevata |
| >500 | Molto calcareo | | |

Fonte SILPA modificata dal GTA

Azoto (N) totale

Esprime la dotazione nel suolo delle frazioni di azoto organico. Il valore di azoto totale può essere considerato un indice di dotazione azotata del terreno, comunque non strettamente correlato alla disponibilità dell'azoto per le piante ed ha quindi di per sé un limitato valore pratico nella pianificazione degli apporti azotati.

Un'eccessiva disponibilità di N nel suolo provoca un ritardo di fioritura, fruttificazione e maturazione, una minor resistenza al freddo e ai parassiti, un aumento dei consumi idrici e un accumulo di nitrati nella pianta.

| Azoto totale (g/Kg) | |
|----------------------------|---------------|
| <0,5 | Molto bassa |
| 0,5-1,0 | Bassa |
| 1,1-2,0 | Media |
| 2,1-2,5 | Elevata |
| >2,5 | Molto elevata |

Fonte Università di Torino

Rapporto C/N

Questo parametro, ottenuto dividendo il contenuto percentuale di carbonio organico per quello dell'azoto totale, è utilizzato per quantificare il grado di umificazione del materiale organico nel terreno.

Tale rapporto è generalmente elevato in presenza di notevoli quantità di residui vegetali indecomposti (paglia, stoppie, ecc.), dato il basso contenuto in sostanze azotate, e diminuisce all'aumentare dei composti organici ricchi d'azoto (letame, liquami), in caso di rapida mineralizzazione della sostanza organica o di un'ingente presenza di azoto minerale.

I terreni con un valore compreso tra 9 e 12 hanno una buona dotazione di sostanza organica, ben umificata e abbastanza stabile nel tempo.

| Rapporto C/N | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| < 9 | Basso | Mineralizzazione veloce |
| 9 -12 | Equilibrato | Mineralizzazione normale |
| > 12 | Elevato | Mineralizzazione lenta |

Fonte Regione Campania

Potassio (K) scambiabile

Il K è presente nel suolo in diverse forme: non disponibile (all'interno di minerali primari), poco disponibile (negli interstrati dei minerali argillosi) e disponibile (sotto forma di ioni scambiabili o disciolto nella soluzione del suolo); la sua disponibilità per le piante dipende dal grado di alterazione dei minerali e dal contenuto di argilla. La forma utile ai fini analitici è quella scambiabile, ossia quella quota di K presente nel suolo cedibile

dal complesso di scambio alla soluzione circolante o da questa restituita e quindi più disponibile all'assorbimento.

Il K nella pianta regola la permeabilità cellulare, la sintesi di zuccheri, proteine e grassi, la resistenza al freddo e alle patologie, il contenuto di zuccheri nei frutti.

Spesso la carenza di K è solo relativa, nel senso che la pianta manifesta sintomi da carenza di K, ma in realtà la causa non è la bassa dotazione di tale elemento nel terreno, bensì l'antagonismo con il Mg (che se presente ad alte concentrazioni viene assorbito in grande quantità a discapito del K).

| Dotazioni di K scambiabile (mg/Kg) | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Giudizio | Terreni sabbiosi (S-SF-FS) | Terreni medio impasto (F-FL-FA-FSA-L) | Terreni argillosi e limosi (A-AL-FLA-AS) |
| basso | < 80 | < 100 | < 120 |
| medio | 80-120 | 100-150 | 120-180 |
| elevato | > 120 | >150 | >180 |

Fonte: elaborazione GTA

Fosforo (P) assimilabile

Questo elemento si trova nel suolo in forme molto stabili e quindi difficilmente solubili (la velocità con cui il fosforo viene immobilizzato in forme insolubili dipende da pH, contenuto in Ca, Fe e Al, quantità e tipo di argilla e di sostanza organica).

Il fosforo è presente sia in forma inorganica (fosfati minerali), sia in forma di fosforo organico (in residui animali e vegetali); la mineralizzazione del fosforo organico aumenta all'aumentare del pH. Agevola la fioritura, l'accrescimento e la maturazione dei frutti oltre che un miglior sviluppo dell'apparato radicale.

Si propone di utilizzare le classi di dotazione proposte dalla SILPA e riportate nella tabella sottostante. In alternativa le singole Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi validati nelle specifiche realtà ed in linea con la proposta SILPA.

| Dotazioni di P assimilabile (mg/Kg) | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Giudizio | Valore P Olsen | Valore P Bray-Kurtz |
| molto basso | <5 | <12,5 |
| basso | 5-10 | 12,5-25 |
| normale | 11-30 | 25,1-75 |
| molto elevato | > 30 | >75 |

Fonte: elaborazione GTA

Elementi scambiabili (Potassio (K), Calcio (Ca) e Magnesio (Mg) scambiabili)

Oltre al potassio, già trattato in precedenza, anche calcio, magnesio e sodio fanno parte del complesso di scambio e nei suoli acidi anche a idrogeno e alluminio. L'interpretazione della dotazione di questi elementi va messa in relazione con la CSC e con il contenuto in argilla.

Interpretazione della dotazione delle basi di scambio in relazione alla CSC (valori espressi in %milliequivalenti sulla CSC)

| Base di Scambio | basso | medio | elevato |
|-----------------|-------|-------|---------|
| Potassio | <2 | 2-4 | >4 |
| Magnesio | <6 | 6-12 | >12 |
| Calcio | <55 | 55-70 | >70 |

Per i calcoli si ricorda che:

1 meq/100g di potassio equivale a 391 ppm (mg/kg) di K

1 meq/100g di magnesio equivale a 120 ppm (mg/kg) di Mg

1 meq/100g di calcio equivale a 200 ppm (mg/kg) di Ca

E' importante anche considerare i rapporti tra gli elementi del complesso di scambio. In particolare il rapporto Mg/K (espressi entrambi in meq/100g) dà indicazioni sulla competizione tra i due elementi per l'assorbimento radicale e, quindi, del rischio di carenza che può verificarsi nel caso in cui uno dei due elementi si trovi ad un livello prossimo alla soglia di sufficienza.

| Rapporto Mg/K | Valutazione | Conseguenze |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| < 2 | Squilibrato per eccesso di K | Rischio di carenza di Mg (*) |
| 2-5 | Ottimale | Nutrizione equilibrata |
| > 5 | Squilibrato per eccesso di Mg | Rischio di carenza di K (*) |
| (*) Solo se il livello dell'elemento è vicino alla soglia di sufficienza | | |

Allegato n° 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE

CONCIMAZIONE AZOTATA DELLE COLTURE ERBACEE

Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:

Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) + perdite per lisciviazione (C) + perdite per immobilizzazione e dispersione (D) -- azoto da residui della coltura in precessione (E).-- azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali (G).

1) Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)

I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sia sulla base degli assorbimenti colturali unitari che dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:

A = assorbimenti colturali unitari x produzione attesa

Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati nella tabella 16. Per assorbimento colturale unitario si intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (culmo, fusto, foglie e radici) per unità di prodotto. In relazione a conoscenze più precise riferite a specifiche realtà regionali è possibile utilizzare coefficienti diversi da quelli proposti in tabella 16; non sono comunque accettabili variazioni superiori a +/- il 30%.

2) Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)

Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall'azoto immediatamente disponibile per la coltura, definito come azoto pronto (b1) e dell'azoto che deriva dalla mineralizzazione della sostanza organica (b2).

2.a Azoto pronto (b1)

Si calcola sulla base della tessitura e del contenuto di azoto totale del suolo.

Tab. 1 Quantità di azoto prontamente disponibile (kg/ha)

| Tessitura | N pronto | Densità apparente |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Tendenzialmente sabbioso | 28,4 x N totale (‰) | 1,42 |
| Franco | 26 x N totale (‰) | 1,30 |
| Tendenzialmente argilloso | 24,3 x N totale (‰) | 1,21 |

Fonte Regione Campania

2.b Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica (b2)

Si calcola sulla base della tessitura, del contenuto di sostanza organica del suolo e del rapporto C/N, vedi tab. 2.

Tab. 2 Azoto mineralizzato (kg/ha) che si rende disponibile in un anno

| Tessitura | C/N | N mineralizzato (1) |
|---------------------------|------|---------------------|
| tendenzialmente sabbioso | 9-12 | 36 x S.O. (%) |
| Franco | | 24 x S.O. (%) |
| tendenzialmente argilloso | | 12 x S.O. (%) |
| tendenzialmente sabbioso | <9 | 42 x S.O. (%) |
| Franco | | 26 x S.O. (%) |
| tendenzialmente argilloso | | 18 x S.O. (%) |
| tendenzialmente sabbioso | >12 | 24 x S.O. (%) |
| Franco | | 20 x S.O. (%) |
| tendenzialmente argilloso | | 6 x S.O. (%) |

1) L'entità della decomposizione della sostanza organica varia dal 2 al 3% per i terreni sabbiosi, dal 1,7 al 2 % per i terreni di medio impasto e da 0,5 al 1,5 % per i terreni argillosi. Con un rapporto C/N < di 9 è stato utilizzato il valore più alto dell'intervallo, viceversa con un rapporto C/N > di 12 ed il valore medio con C/N equilibrato. I valori riportati in tabella sono calcolati considerando una profondità di 20 cm e che il contenuto di azoto nella sostanza organica sia del 5%. La quantità di azoto che si rende disponibile rimane costante per tenori di S.O. superiori al 3%

Fonte Regione Campania

Gli apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica sono disponibili per la coltura in relazione al periodo in cui essa si sviluppa, pertanto nel calcolo di questa quota è necessario considerare il coefficiente tempo. Per le colture pluriennali, ad esempio i prati, si considera valido un **Coefficiente tempo** pari a 1; mentre per altre colture con ciclo inferiore a dodici mesi, si utilizzano, anche in relazione al regime termico e pluviometrico del periodo di crescita della coltura, dei coefficienti inferiori all'unità (ad esempio se il ciclo colturale è pari a 6 mesi, il coefficiente tempo è 0,5). I coefficienti tempo proposti per le diverse colture sono riportati in tabella 17.

Quindi: $b_2 = \text{azoto liberato in un anno} \times \text{coefficiente tempo}$.

3) Perdite per lisciviazione (C)

Devono essere stimate prendendo in considerazione l'entità delle precipitazioni (metodo c1) oppure le caratteristiche del terreno ed in particolare la facilità di drenaggio e la tessitura (metodo c2).

3.a Metodo in base alle precipitazioni (c1)

Nelle realtà dove le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunno-invernale, in genere, si considerere dilavabile quella quota di azoto che nel bilancio entra come "N pronto".

Mentre nelle situazioni con surplus pluviometrico significativo anche durante il periodo primaverile estivo e con suoli a scarsa ritenzione idrica si deve considerare perdibile oltre all'azoto pronto anche una frazione dell'azoto delle fertilizzazioni e di quello derivante dalla mineralizzazione della S.O.

Le perdite per lisciviazione nel periodo autunno invernale sono stimate prendendo come riferimento l'entità delle precipitazioni nell'intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 31 gennaio come di seguito riportato:

- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdita dell'azoto pronto progressivamente crescente;
- con pioggia >250 mm: tutto l'azoto pronto viene perso.

Per calcolare la % di N pronto che si considera dilavata in funzione delle precipitazioni si utilizza la seguente espressione:

$$x = (y - 150)$$

dove:

y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.

3.b Metodo in base alla facilità di drenaggio (c2)

Il calcolo delle perdite di azoto nel terreno per lisciviazione in base al drenaggio e alla tessitura possono essere stimate adottando il seguente schema.

Tab. 3 Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della facilità di drenaggio e della tessitura del terreno.

| Drenaggio(*) | Tessitura | | |
|------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| | tendenzialmente sabbioso | Franco | tendenzialmente argilloso |
| Lento o impedito | 50 (**) | 40 (**) | 50 (**) |
| Normale | 40 | 30 | 20 |
| Rapido | 50 | 40 | 30 |

(*) L'entità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o determinata con un esame pedologico

(**) questi valori tengono conto anche dell'effetto negativo che la mancanza di ossigeno causa sui processi di mineralizzazione della sostanza organica.

Fonte Regione Campania

4) Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)

Le quantità di azoto che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla biomassa, nonché per processi di volatilizzazione e denitrificazione sono calcolate come percentuali degli

apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto pronto (b1) e azoto derivante dalla mineralizzazione (b2)) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati nella tabella che segue.

$$D = (b1+b2) \times fc$$

Tab. 4 Fattori di correzione da utilizzare per valutare l'immobilizzazione e la dispersione dell'azoto nel terreno

| Drenaggio | Tessitura | | |
|------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| | tendenzialmente sabbioso | franco | tendenzialmente argilloso |
| lento o impedito | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| Normale | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| Rapido | 0,15 | 0,20 | 0,25 |

Fonte Regione Campania

5) Azoto da residui della coltura in precessione (E)

I residui delle colture precedenti una volta interrati subiscono un processo di demolizione che porta in tempi brevi alla liberazione di azoto. Se però questi materiali risultano caratterizzati da un rapporto C/N elevato, si verifica l'effetto contrario con una temporanea riduzione della disponibilità di azoto. Tale fenomeno è causato da microrganismi che operano la demolizione dei residui e che per svilupparsi utilizzano l'azoto minerale presente nella soluzione circolante del terreno. Pertanto il contributo della voce "azoto da residui" non è sempre positivo.

Nella tabella 5 sono indicati per alcune precessioni i valori degli effetti residui

Tab. 5 - Azoto disponibile in funzione della coltura in precessione (kg/ha)

| Coltura | N da residui (kg/ha) |
|--|----------------------|
| Barbabietola | 30 |
| Cereali autunno-vernini | |
| - paglia asportata | -10 |
| - paglia interrata | -30 |
| Colza | 20 |
| Girasole | 0 |
| Mais | |
| - stocchi asportati | -10 |
| - stocchi interrati | -40 |
| Prati | |
| - Medica in buone condizioni | 80 |
| - polifita con + del 15% di leguminose o medicaio diradato | 60 |
| - polifita con leguminose dal 5 al 15% | 40 |
| - polifita con meno del 5% di leguminose | 15 |
| - di breve durata o trifoglio | 30 |
| Patata | 35 |
| Pomodoro, altre orticole (es.: cucurbitacee, crucifere e liliacee) | 30 |
| Orticole minori a foglia | 25 |
| Soia | 0 |
| Leguminose da granella (pisello, fagiolo, lenticchia, ecc.) | 40 |
| Sorgo | -40 |
| Sovescio di leguminose (in copertura autunno-invernale o estiva) | 50 |

Fonte AA vari

6) Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)

L'azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli anni precedenti varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si applica alla quantità totale di azoto contenuto nel prodotto ammendante abitualmente apportato nel caso di apporti regolari (Tab. 6) o alla quantità effettivamente distribuita l'anno precedente per apporti saltuari (vedi "disponibilità nel 2° anno" di Tab. 7). Questo supplemento di N si rende disponibile nell'arco di un intero anno e va opportunamente ridotto in relazione al ciclo del singolo tipo di coltura. Tale valore fornisce una stima della fertilità residua derivante dagli apporti organici effettuati gli anni precedenti e non include l'azoto che si rende disponibile in seguito ad eventuali fertilizzazioni organiche che si fanno alla coltura per la quale si predispone il bilancio dell'azoto. In presemina/impianto delle colture erbacee pluriennali non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti.

Tab. 6 - Apporti di fertilizzanti organici con cadenza temporale regolare: coefficiente % di recupero annuo della quantità di elementi nutritivi mediamente distribuita

| Matrici organiche | tutti gli anni | ogni 2 anni | ogni 3 anni |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Ammendanti | 50 | 30 | 20 |
| Liquame bovino | 30 | 15 | 10 |
| Liquame suino e pollina | 15 | 10 | 5 |

Fonte Regione Emilia Romagna

Tab. 7 – Apporti saltuari di ammendanti (una tantum): coefficiente % di mineralizzazione

| |
|---------------------------|
| Disponibilità nel 2° anno |
| 20 |

Fonte Regione Emilia Romagna.

7) Azoto da apporti naturali (G)

Con questa voce viene preso in considerazione il quantitativo di azoto che giunge al terreno con le precipitazioni atmosferiche e, nel caso di colture leguminose, anche quello catturato dai batteri simbiotici azoto fissatori.

L'entità delle deposizioni varia in relazione alle località e alla vicinanza o meno ai centri urbani ed industriali. Nelle zone di pianura limitrofe alle aree densamente popolate si stimano quantitativi oscillanti intorno ai 20 kg/ha anno. Si tratta di una disponibilità annuale che va opportunamente ridotta in relazione al ciclo delle colture. Per quanto riguarda i fenomeni di azoto fissazione occorre che siano valutati in relazione alle specifiche caratteristiche della specie leguminosa coltivata.

Concimazione azotata delle colture arboree

Fase di piena produzione

Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare ad una coltura arborea in piena produzione si applica la seguente relazione:

Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) + perdite per lisciviazione (C) + perdite per dispersione (D) - azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali (G).

1) Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)

I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sulla base degli assorbimenti colturali unitari e dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:

$$A = \text{assorbimento colturale unitario} \times \text{produzione attesa}$$

Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati in tabella 16. Per assorbimento colturale unitario si intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (fusto, rami, foglie e radici) per unità di prodotto.

Il fabbisogno della coltura può essere anche stimato calcolando solo l'effettiva asportazione operata con la raccolta dei frutti (vedi tabella 16) a cui bisognerà però aggiungere una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base, in kg, vedi tabella 18).

2) Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)

Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall'azoto in forma minerale assimilabile dalle piante che si libera in seguito ai processi di mineralizzazione della sostanza organica. La disponibilità annuale è riportata in tabella 2 (vedi bilancio delle colture erbacee).

Si precisa che per tenori di S.O. superiori al 3% la quantità di azoto disponibile si considera costante.

3) Perdite per lisciviazione (C)

In relazione all'andamento climatico e alle caratteristiche pedologiche possono determinarsi delle perdite di azoto per lisciviazione.

Tali perdite vengono stimate prendendo come riferimento l'entità delle precipitazioni in determinati periodi dell'anno, generalmente nella stagione autunno invernale nell'intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 31 gennaio, come di seguito riportato:

- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdite per lisciviazione progressivamente crescenti da 0 a 30 kg/ha;
- con pioggia >250 mm: perdite per lisciviazione pari a 30 kg/ha.

Per calcolare la perdita di N quando le precipitazioni sono comprese tra 150 e 250 mm si utilizza la seguente espressione:

$$\text{Perdita (kg/ha)} = (30 \times (y-150)/100)$$

dove: y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.

4) Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)

Le quantità di azoto, che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla biomassa per processi di volatilizzazione e denitrificazione, sono calcolate come percentuali degli apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati nella tabella 4 .

$$D = B \times fc$$

5) Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)

Vedi punto 6) del bilancio delle colture erbacee.

6) Apporti naturali (G)

Vedi punto 7 del bilancio delle colture erbacee.

Fase di impianto e allevamento

In pre impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti.

Nella fase di allevamento gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla quantità di piena produzione.

Non si deve superare il 40% il primo anno di allevamento ed il 50% negli anni successivi dei quantitativi previsti nella fase di piena produzione

Impiego dei fertilizzanti contenenti azoto**Epoche e modalità di distribuzione**

Una volta stimato il fabbisogno di azoto della coltura in esame occorre decidere come e quando soddisfarlo. Per ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l'efficienza della concimazione occorre distribuire l'azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo in più distribuzioni se i quantitativi sono elevati.

Per terreni a basso rischio di perdita si intendono quei suoli a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA, AS, AL e A) con profondità utile per le radici elevata (100 – 150 cm).

Per le colture erbacee ed orticole il quantitativo da distribuire per singolo intervento non deve superare i 100 Kg/ha. Per le colture arboree non deve superare i 60 Kg/ha. In caso di apporti superiori è obbligatorio il frazionamento.

Questo vincolo non si applica alle quote di azoto effettivamente a lenta cessione.

I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di Carbonio umico e fulvico non inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% (D.L n° 75/2010 Allegato I punto 6 – Disciplina in materia di fertilizzanti-), vengono considerati a "rilascio graduale" ed equiparati ai concimi a lenta cessione.

Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di azoto in pre-semina/pre-trapianto nei seguenti casi:

- colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla semina;
- uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante; in questi casi la somministrazione di N in presemina non può comunque essere superiore a 30 kg/ha;
- colture a ciclo autunno vernino in ambienti dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione e comunque con apporti inferiori a 30 kg/ha.
- Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo l'eventuale letamazione.

Per l'utilizzo di ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissati vincoli specifici relativi all'epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre, comunque, operare in modo da incorporarli al terreno e devono comunque essere rispettate le norme igienico sanitarie.

Eventuali ulteriori specifiche sull'impiego dei fertilizzanti azotati possono venire indicate nelle norme dei disciplinari regionali di coltura.

Efficienza dell'azoto apportato coi fertilizzanti**Efficienza dei concimi di sintesi**

Per i concimi minerali di sintesi si assume un valore di efficienza del 100%.

Efficienza degli effluenti zootecnici

Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio si deve considerare che pur essendo caratterizzati da azione abbastanza “pronta”, simile a quella dei concimi di sintesi, presentano rispetto a questi, per quanto riguarda l'azoto, una minore efficienza.

Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario prendere in considerazione un coefficiente di efficienza che varia in relazione all'epoca/modalità di distribuzione, alla cultura, al tipo di effluente e alla tessitura del terreno.

Bisogna dapprima individuare il livello di efficienza (bassa, media e alta) in relazione alle modalità ed epoche di distribuzione, vedi tabella 9.

Successivamente si sceglie in funzione del tipo di effluente e della tessitura il valore del coefficiente da utilizzare, vedi tabella 8.

Tenendo presente che apporti consistenti in un'unica soluzione hanno per diversi motivi una minor efficacia rispetto alle distribuzioni di minor entità e frazionate in più interventi, volendo essere maggiormente precisi, si potrebbe valutare, come ulteriore fattore che incide sul coefficiente di efficienza, anche la quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione.

In tabella 8 (a, b, c) è riportata una un'ulteriore disaggregazione che tiene conto del fattore dose.

Tab. 8a Coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli

| | Tessitura grossolana | | | Tessitura media | | | Tessitura fine | | |
|---------------|----------------------|-------|------|-----------------|-------|------|----------------|-------|------|
| | Dose (2) | | | Dose (2) | | | Dose (2) | | |
| | bassa | media | Alta | bassa | media | alta | bassa | media | alta |
| Efficienza(1) | | | | | | | | | |
| Alta | 79 | 73 | 67 | 71 | 65 | 58 | 63 | 57 | 50 |
| Media | 57 | 53 | 48 | 52 | 48 | 43 | 46 | 42 | 38 |
| Bassa | 35 | 33 | 29 | 33 | 31 | 28 | 29 | 28 | 25 |

Tab. 8b Coefficienti di efficienza degli effluenti bovini

| | Tessitura grossolana | | | Tessitura media | | | Tessitura fine | | |
|---------------|----------------------|-------|------|-----------------|-------|------|----------------|-------|------|
| | Dose (2) | | | Dose (2) | | | Dose (2) | | |
| | bassa | media | Alta | bassa | media | alta | bassa | media | alta |
| Efficienza(1) | | | | | | | | | |
| Alta | 67 | 62 | 57 | 60 | 55 | 49 | 54 | 48 | 43 |
| Media | 48 | 45 | 41 | 44 | 41 | 37 | 39 | 36 | 32 |
| Bassa | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 25 | 24 | 21 |

Tab. 8c Coefficienti di efficienza degli effluenti avicoli

| | Tessitura grossolana | | | Tessitura media | | | Tessitura fine | | |
|---------------|----------------------|-------|------|-----------------|-------|------|----------------|-------|------|
| | Dose (2) | | | Dose (2) | | | Dose (2) | | |
| | bassa | media | Alta | bassa | media | alta | bassa | media | alta |
| Efficienza(1) | | | | | | | | | |
| Alta | 91 | 84 | 77 | 82 | 75 | 67 | 72 | 66 | 58 |
| Media | 66 | 61 | 55 | 60 | 55 | 49 | 53 | 48 | 44 |
| Bassa | 40 | 38 | 33 | 38 | 36 | 32 | 33 | 32 | 29 |

Tabelle elaborate dal GTA sulla base della Tabella 2 dell'Allegato V del DM 5046/2016

- 1) La scelta del livello di efficienza (Alta, Media o Bassa) deve avvenire in relazione alle epoche/modalità di distribuzione (vedi tab. 9).
- 2) La dose (kg/ha di N) è da considerarsi: bassa < 125 media tra 250 e 125; alta > 250.

Tab.9 Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità ed epoche di distribuzione¹

| Colture | Epoche | Modalità | Efficienza |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili- estivi | Prearatura primaverile | Su terreno nudo o stoppie | Alta |
| | Prearatura estiva o autunnale | Su paglie o stocchi | Media |
| | | Su terreno nudo o stoppie | Bassa |
| | Copertura | Con interrimento | Alta |
| | | Senza interrimento | Media |
| Cereali autunno - vernini ed erbai autunno - primaverili | Prearatura estiva | Su paglie o stocchi | Media |
| | Prearatura estiva | Su terreno nudo o stoppie | Bassa |
| | Fine inverno primavera | Copertura | Media |
| Colture di secondo raccolto | Estiva | Preparazione del terreno | Alta |
| | Estiva in copertura | Con interrimento | Alta |
| | Copertura | Senza interrimento | Media |
| | Fertirrigazione | Copertura | Media |
| Prati di graminacee misti o medicali | Prearatura primaverile | Su paglie o stocchi | Alta |
| | | Su terreno nudo o stoppie | Media |
| | Prearatura estiva o autunnale | Su paglie o stocchi | Media |
| | | Su terreno nudo o stoppie | Bassa |
| | Dopo i tagli primaverili | Con interrimento | Alta |
| | | Senza interrimento | Media |
| | Dopo i tagli estivi | Con interrimento | Alta |
| | | Senza interrimento | Media |
| | Autunno precoce | Con interrimento | Media |
| | | Senza interrimento | Bassa |
| Pioppeti ed arboree | Pre-impianto | | Bassa |
| | Maggio-Settembre | Con terreno inerbito | Alta |
| | | Con terreno lavorato | Media |

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno
Fonte DM 5046 del 25 febbraio 2016

Efficienza dei digestati

I livelli di efficienza dei digestati sono da valutarsi in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione nonché delle colture oggetto di fertilizzazione secondo quanto riportato nella precedente tabella 9.

Tab. 10 Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--|----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Livello efficienza | Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse vegetali | Digestato da liquami suini | Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse | Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate) | Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4 | Digestato da sole biomasse vegetali | Frazioni separate palabili |
| Alta | 55 | 65 | Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6 | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Media | 41 | 48 | | 55 | 48 | 41 | 41 |
| bassa | 26 | 31 | | 36 | 31 | 26 | 26 |

Fonte DM 5046 del 25 febbraio 2016

Efficienza degli ammendanti organici

Ai fini dell'utilizzazione agronomica si considerano ammendanti quei fertilizzanti, come ad esempio il letame bovino maturo, in grado di migliorare le caratteristiche del terreno e che diversamente da altri effluenti zootecnici come i liquami e le polline rilasciano lentamente ed in misura parziale l'azoto in essi contenuto. Come caratteristiche minime di riferimento si può assumere che detti materiali debbano avere un contenuto di sostanza secca > al 20% ed un rapporto C/N maggiore di 11.

Mediamente si considera che nell'anno di distribuzione circa il 40 % dell'ammendante incorporato nel suolo subisca un processo di completa mineralizzazione.

Concimazione fosfatica**COLTURE ERBACEE ANNUALI E PLURIENNALI E COLTURE ARBOREE IN PRODUZIONE**

Per calcolare gli apporti di fosforo da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:

$$\text{Concimazione fosfatica} = \text{fabbisogni colturali (A)} \pm [\text{apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B)} \times \text{immobilizzazione (C)}]$$

1) Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)

I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di fosforo della coltura, determinato sulla base delle asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:

$$A = \text{asportazione colturale unitaria} \times \text{produzione attesa}$$

Per asportazione colturale unitaria si intende la quantità di fosforo assorbita dalla pianta e che esce dal sistema suolo/pianta con la raccolta dei prodotti

Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del fosforo che viene immobilizzato nelle strutture permanenti dell'albero.

I coefficienti di asportazione unitari di riferimento sono riportati in tabella 16.

2) Apporti di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)

Le disponibilità di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo sono stimate sulla base di quanto indicato nelle "Norme ed indicazioni di carattere generale" al punto "Fosforo assimilabile". In alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA le Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi di maggior dettaglio e validati per le specifiche realtà. Di seguito si riportano, a titolo di esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni Campania (Tab. 11) ed Emilia Romagna (Tab. 12).

- Se la dotazione è media o elevata, B = 0. In questo caso è ammesso effettuare una concimazione di mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
- Se la dotazione è bassa o molto bassa, si calcola la quota di arricchimento (B1)
- Se la dotazione è molto elevata, si calcola la quota di riduzione (B2).

Per calcolare la quota di arricchimento (B1) e la quota di riduzione (B2), si tiene conto della seguente relazione:

$$PxDaxQ$$

dove:

P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;

Da è la densità apparente del terreno, pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso, 1,3 per un terreno franco, 1,2 per un terreno tendenzialmente argilloso.

Q: è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione risultante dalle analisi.

L'indicazione per la determinazione di Q è corretta nel caso B1, ma non nel caso B2.

Per B2 la formula più logica sembrerebbe la seguente: $[A - B - ((P-1)xDaxQ \times C)]$

3) Immobilizzazione (C)

Il fattore di immobilizzazione (C) tiene conto della quantità di fosforo che viene resa indisponibile ad opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è calcolato nel seguente modo:

$$C = a + (0,02 \times \text{calcare totale } [\%])$$

a= 1,2 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un terreno franco; 1,4 per un terreno tendenzialmente argilloso.

Tab.11 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione "normale" in P₂O₅ (mg/kg)

| Classe coltura | Tendenzialmente sabbioso | Franco | Tendenzialmente argilloso |
|---|--------------------------|------------|---------------------------|
| frumento duro, frumento tenero, sorgo, avena, orzo | da 18 a 25 | da 23 a 28 | da 30 a 39 |
| mais ceroso, mais da granella, soia, girasole | da 1a a 21 | da 18 a 25 | da 23 a 30 |
| barbabietola, bietola | da 23 a 30 | da 30 a 39 | da 34 a 44 |
| tabacco, patata, pomodoro da industria, pisello fresco, pisello da industria, asparago, carciofo, cipolla, aglio, spinacio, lattuga, cocomero, melone, fagiolino da industria, fagiolo da industria, fragola, melanzana, peperone, cavolfiore | da 25 a 30 | da 30 a 35 | da 35 a 40 |
| medica e altri erbai | da 34 a 41 | da 41 a 50 | da 46 a 55 |
| Arboree | da 16 a 25 | da 21 a 39 | da 25 a 48 |

Fonte Regione Campania

Tab. 12 Concentrazioni di fosforo assimilabile (mg/Kg di P₂O₅ - metodo Olsen) nel terreno ritenute normali per le diverse colture in relazione alla tessitura del terreno.

| Colture o gruppi | Tessitura grossolana (Sabbia > 60 %) | Tessitura media | Tessitura fine (argilla >35 %) |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Poco esigenti: cereali, foraggere di graminacee e prati stabili. | 16 – 27 | 18 – 30 | 21 - 32 |
| Mediamente esigenti: medica, soia, foraggere leguminose, orticole a foglia, cucurbitacee, altre orticole minori e arboree. | 25 – 37 | 27 – 39 | 30 - 41 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Molto esigenti: barbabietola, cipolla, patata, pomodoro e sedano. | 34 – 46 | 37 – 48 | 39 – 50 |
|--|---------|---------|---------|

Fonte Regione Emilia Romagna

CONCIMAZIONE POTASSICA

COLTURE ERBACEE ANNUALI E PLURIENNALI E COLTURE ARBOREE IN PRODUZIONE

Per calcolare gli apporti di potassio da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:

$$\text{Concimazione potassica} = \text{fabbisogni colturali (E)} + [\text{apporti derivanti dalla fertilità del suolo (F)} \times \text{immobilizzazione (G)}] + \text{lisciviazione (H)}$$

1) Fabbisogni colturali (E) (kg/ha)

I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di potassio della coltura, determinato sulla base degli asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:

$$A = \text{asportazione colturale unitaria} \times \text{produzione attesa}$$

Per asportazione colturale si intende la quantità di potassio assorbita dalla pianta e che esce dal sistema suolo pianta con la raccolta dei prodotti.

Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del potassio che viene immobilizzato nelle strutture permanenti dell'albero e che non ritorna nel terreno.

Le asportazioni unitarie di riferimento sono riportate in tabella 16

2) Disponibilità di potassio derivanti dalla fertilità del suolo (F) (kg/ha)

Sono stimate sulla base della griglia riportata nelle "Norme ed indicazioni di carattere generale" al punto "Potassio scambiabile". In alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA le Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi e validati nelle proprie realtà. Di seguito si riportano, a titolo di esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna (Tab. 12).

- Se la dotazione è normale (giudizio = medio), $F = 0$. In questo caso è ammesso effettuare una concimazione di mantenimento che copra le asportazioni delle colture.

- Se la dotazione è più bassa del limite inferiore della normalità, si calcola la quota di arricchimento (F1)

- Se la dotazione è più alta del limite superiore della dotazione considerata normale, si calcola la quota di riduzione (F2).

Per calcolare la quota di arricchimento (F1) e la quota di riduzione (F2), si tiene conto della seguente relazione:

$$P \times D \times Q$$

dove:

P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;

Da è la densità apparente del terreno: pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un terreno franco; 1,2 per un terreno tendenzialmente argilloso.

Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione risultante dalle analisi.

L'indicazione per la determinazione di Q è corretta nel caso F1, ma non nel caso F2.

Per F2 la formula più logica sembrerebbe la seguente: $[A - F - ((P-1) \times D \times Q \times G) + H]$

3) Immobilizzazione (G)

Il fattore di immobilizzazione (G) tiene conto della quantità di potassio che viene reso indisponibile ad opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è calcolato nel seguente modo:

$$G = 1 + (0,018 \times \text{Argilla} [\%])$$

4) Lisciviazione (H)

L'entità delle perdite per lisciviazione (kg/ha) possono essere stimate ponendole in relazione alla facilità di drenaggio del terreno o al suo contenuto di argilla.

Nel primo caso si utilizza lo schema sotto riportato:

| DRENAGGIO (**) | Terreno | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| | Tendenzialmente sabbioso | Franco | Tendenzialmente argilloso |
| Normale, lento od impedito | 25 | 15 | 7 |
| Rapido | 35 | 25 | 17 |

Fonte Regione Campania

(**) La facilità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o determinata con un esame pedologico

Nel secondo caso

Valori di lisciviazione annuale del potassio in relazione all'argillosità del terreno.

| Argilla % | K ₂ O (kg/ha) |
|------------|--------------------------|
| Da 0 a 5 | 60 |
| Da 5 a 15 | 30 |
| Da 15 a 25 | 20 |
| > 25 | 10 |

Fonte: Regione Emilia Romagna

Tab.13 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione "normale" in K₂O (mg/kg)

| Classe coltura | Tendenzialmente e sabbioso | Franco | Tendenzialmente argilloso |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| tutte le colture | da 102 a 144 | da 120 a 180 | Da 144 a 216 |

Fonte Regione Campania e Regione Emilia-Romagna.

Apporti localizzati ed effetto "partenza" del fosforo

Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la concimazione fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la distribuzione localizzata di P₂O₅ fino ad un massimo di 20 kg/ha.

FERTILIZZAZIONE DI FONDO CON FOSFORO E POTASSIO

Colture pluriennali in pre Impianto

Considerata la scarsa mobilità di questi elementi, occorre garantirne la localizzazione nel volume di suolo esplorato dalle radici. Per questo motivo nelle colture pluriennali (es. arboree, prati, ecc.) in pre-impianto, in terreni con dotazioni scarse o normali, è possibile anticipare totalmente o in parte le asportazioni future della coltura.

Se la dotazione è elevata le anticipazioni con P e K non sono, in genere, da ammettere; fanno eccezione quei casi in cui l'esubero di detti elementi nel terreno non è particolarmente consistente e risulta inferiore alle probabili asportazioni future che si realizzeranno durante l'intero ciclo dell'impianto.

Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazione) agli apporti che si effettueranno in copertura.

In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P₂O₅ e a 300 kg/ha di K₂O.

CONCIMAZIONE CON FOSFORO E POTASSIO IN PRODUZIONE (COLTURE ARBOREE)

Nella fase di allevamento degli impianti fruttiferi-viticoli l'apporto di fosforo e potassio, al fine di assicurare un'adeguata formazione della struttura della pianta, può essere effettuato anche in assenza di produzione di frutti.

Se la dotazione del terreno è scarsa e in pre impianto non è stato possibile raggiungere il livello di dotazione normale apportando il quantitativo massimo previsto (riferimento paragrafo), è consigliato completare l'apporto iniziato in pre impianto. Pertanto, oltre alla quota annuale prevista per la fase di allevamento, è possibile distribuire anche la parte restante di arricchimento.

In condizioni di normale dotazione del terreno, devono essere apportati indicativamente i quantitativi riportati nella seguente tabella.

Tab. 14 Apporti di fosforo e potassio negli impianti in allevamento (come % dell'apporto totale consentito nella fase di produzione).

| P ₂ O ₅ | | K ₂ O | |
|-------------------------------|----------|------------------|----------|
| I° anno | II° anno | I° anno | II° anno |
| 30% | 50% | 20% | 40% |

Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno.

Impiego dei fertilizzanti contenenti Fosforo e Potassio

Epoche e modalità di distribuzione

In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l'esigenza di adottare modalità di distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l'efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione del terreno. Per il fosforo si ammette la localizzazione alla semina e l'impiego fino alla fase di pre-emergenza dei concimi liquidi.

Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo e sia al fatto che in genere vengono sarchiate, benché sia fortemente consigliato apportare questi elementi durante la preparazione del terreno, ne è tuttavia consentita la distribuzione in copertura.

In caso di avvicendamenti che includono colture particolarmente esigenti in P o K la quantità da distribuire può essere ridotta o annullata sulle colture meno esigenti e concentrata su quelle maggiormente esigenti, all'interno di un piano di fertilizzazione pluriennale.

Nelle colture pluriennali è raccomandato anticipare, almeno in parte all'impianto (rispettando i massimali annuali sopra indicati per l'arricchimento) le asportazioni relative all'intero ciclo; sono parimenti consentiti anche gli apporti in copertura.

Fertilizzazione organica

Tale pratica consiste nell'apportare sostanza organica (S.O.) di varia origine (letami, compost, liquami) per migliorare la fertilità del terreno in senso lato.

Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella strutturale. La prima si esplica con la messa a disposizione delle piante, degli elementi nutritivi in forma più o meno pronta e solubile (forma minerale), la seconda permette invece di migliorare la fertilità fisica del terreno. Le due funzioni sono in antagonismo fra loro, in quanto una facile e rapida degradabilità della sostanza organica da origine ad una consistente disponibilità di nutrienti, mentre l'azione strutturale si esplica in maggior misura quanto più il materiale organico apportato è resistente a questa demolizione. I liquami sviluppano principalmente la funzione nutrizionale mentre i letami quella strutturale.

Funzione strutturale della materia organica

L'apporto di ammendanti con lo scopo di mantenere e/o accrescere il contenuto di sostanza organica nei terreni è una pratica da favorire. D'altra parte apporti eccessivi effettuati con una logica di "smaltimento" aumentano i rischi di perdite di azoto e di inquinamento ambientale.

Si ritiene quindi opportuno fissare dei quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del tenore di sostanza organica del terreno. Vedi tabella 15.

Tab. 15 Apporti di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica.

| Dotazione terreno in s.o. | Apporti massimi annuali (t s.s./ha) |
|---------------------------|---|
| Bassa | 15 |
| Normale | 13 |
| Elevata | 9 (quantitativi inferiori a 9 t non necessitano di giustificazione tramite analisi chimica) |

La concimazione organica effettuata all'impianto delle colture arboree può essere effettuata nei limiti quantitativi espressi in tabella aumentati del 30%.

Funzione nutrizionale della materia organica

I fertilizzanti organici maggiormente impiegati sono i reflui di origine zootecnica (letame, liquami e i materiali palabili) e i compost. Questi contengono, in varia misura, tutti i principali elementi nutritivi necessari alla crescita delle piante. Quando possibile occorre utilizzare i titoli desumibili dai parametri ufficiali di riferimento (DM n. 5046 del 25 febbraio 2016). In tabella 16 sono riportati valori indicativi dei diversi fertilizzanti organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori di riferimento ufficiali.

Tab. 16 Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami prodotti da diverse specie zootecniche.

| Residui organici | SS (% t.q.) | Azoto (kg/t t.q.) | P (kg/t t.q.) | K (kg/t t.q.) |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Letame | | | | |
| - bovino | 25 | -3,69 | 1,05 | 5,8 |
| - suino | 25 | 4,58 – | 1,8 | 4,5 |
| - ovino | 31 | 3,67 | 1 | 15 |
| Materiali palabili | | | | |
| - lettiera esausta polli da carne | 70 | -30,32 | 19 | -15,5 |
| - pollina pre-essiccata | -67,5 | -25,55 | 12 | 19,5 |
| Liquame | | | | |
| - bovini da carne | -8,5 | 4,24 | 1,25 | 3,15 |
| - bovini da latte | 13 | 4,64 | 1,3 | 4,2 |
| - suini | 3,75 | 2,65 | 1,25 | 2,05 |
| - ovaiole | 22 | -13,07 | 4,5 | 5,25 |

L'effettiva disponibilità di nutrienti per le colture è però condizionata da due fattori:

- 1) i processi di mineralizzazione a cui deve sottostare la sostanza organica;
- 2) l'entità anche consistente che possono assumere le perdite di azoto (es. volatilizzazione) durante e dopo gli interventi di distribuzione.

Per gli ammendanti (letame, compost) è importante tenere conto del primo fattore e si deve fare riferimento a quanto detto nel capitolo "Efficienza ammendanti organici". Se ad esempio, si distribuisce del letame per un apporto ad ettaro equivalente a 200 kg di N, 120 kg di P₂O₅ e 280 kg di K₂O, occorre considerare che nel primo anno si renderà disponibile il 40% di queste quantità pari rispettivamente 80 kg di N, 48 di P₂O₅ e 112 di K₂O.

Per i concimi organici invece è più rilevante il secondo fattore e si deve fare riferimento ai coefficienti di efficienza riportati al capitolo "efficienza degli effluenti zootecnici".

L'elemento "guida" che determina le quantità massime di fertilizzante organico che è possibile distribuire è l'azoto. Una volta fissata detta quantità si passa ad esaminare gli apporti di fosforo e potassio.

Nella pratica si possono verificare le seguenti situazioni:

- le quote di P e K apportate con la distribuzione dei fertilizzanti organici determinano il superamento dei limiti ammessi. In questo caso il piano di fertilizzazione è da ritenersi conforme, ma non sono consentiti ulteriori apporti in forma minerale.
- le quote di P e K da fertilizzanti organici non esauriscono la domanda di elemento nutritivo, per cui è consentita l'integrazione con concimi minerali, fino a coprire il fabbisogno della coltura.

•

Epoche e modalità di distribuzione

Per l'utilizzo degli ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissate indicazioni specifiche riguardanti la distribuzione. Occorrerà, comunque, operare in modo da incorporarli adeguatamente nel terreno e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie.

L'impiego di ammendanti è ammesso su tutte le colture, anche su quelle nelle quali non è previsto l'apporto di azoto. È ad esempio possibile letamare in pre-impianto un frutteto, un medicaio o una leguminosa annuale.

Casi particolari

Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare i concimi organici e organo minerali (NP, NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in forma umificata.

La presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di retrogradazione che si verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una buona efficienza di detti concimi. Analogamente l'efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle distribuzioni localizzate alla semina.

Ai concimi organo minerali e ai formulati per l'impiego localizzato del fosforo, vengono aggiunte generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano caratterizzati da un titolo di azoto basso che però non è trascurabile.

Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non è ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l'epoca di distribuzione è lontana da quella di intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri azoto fissatori, ecc., l'impiego di tali prodotti sarebbe precluso.

In relazione alle considerazioni relative all'efficienza sopra esposte, l'impiego dei fertilizzanti organici / organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile purché sia accertata la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l'apporto di N non sia superiore ai:

- 30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;
- 10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.

Per quanto riguarda gli apporti massimi di P₂O₅ e K₂O si specifica che le indicazioni riportate nel capitolo Concimazione di fondo con fosforo e potassio sono relative all'impiego dei concimi così come definiti dal D.Lgs. 75/2010 mentre se si utilizzano fertilizzanti organici come ammendanti, effluenti di allevamento, digestati o fanghi di origine agro-alimentare valgono le prescrizioni riportate al capitolo "Fertilizzazione organica".

Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad esempio per la difesa fitosanitaria, per l'inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc., possono contenere anche dell'azoto. L'impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre possibile purché la distribuzione di azoto non superi i 20 kg/ha di N. L'azoto apportato, anche se di piccola entità, deve comunque essere conteggiato al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.

Le concimazioni fogliari

Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono sempre consentite. Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei quantitativi massimi ammessi.

Tab. 17 Asportazioni unitarie indicative dei principali elementi nutritivi di alcune colture floricole (valori espressi in g/pianta intera)

| Coltura | Asportazioni di azoto (N) (g/pianta intera) | Asportazioni di fosforo (P₂O₅) (g/pianta intera) | Asportazioni di potassio (K₂O) (g/pianta intera) | Fonte |
|----------------|--|---|--|--------------|
| anemone | 0,4 | 2,5 | 5,0 | (1) |
| anturio | 13,3 | 3,3 | 10,0 | (1) |
| asparago | 2,1 | 0,3 | 1,4 | (2) |
| ciclamino | 0,6 | 0,2 | 1,2 | (2) |
| crisantemo | 2,0 | 1,4 | 1,6 | (1) |
| | 1,0 | 0,3 | 2,1 | (2) |
| fresia | 2,6 | 1,6 | 3,3 | (1) |
| garofano | 1,3 | 0,5 | 19,5 | (1) |
| | 1,3 | 0,5 | 2,0 | (2) |
| gerbera | 3,8 | 0,9 | 6,3 | (1) |
| gladiolo | 0,7 | 0,6 | 25,0 | (1) |
| lilium | 0,4 | 0,1 | 0,5 | (1) |
| ranuncolo | 0,4 | 0,2 | 0,7 | (2) |
| rosa | 1,5 | 0,4 | 1,3 | (1) |
| | 4,7 | 1,1 | 3,1 | (2) |
| tulipano | 5,0 | 4,0 | 6,5 | (1) |
| ortensia | 0,31 | 0,13 | 0,43 | (2) |

Fonti: (1) Guida alla concimazione- AA. VV. - Regione Campania

(2) Colture protette - ortoflorovivaismo - Romano Tesi - Edagricole

Tab. 18 Coefficienti tempo delle colture

| Coltura | Coefficiente |
|------------------------------------|---------------------|
| Floricole con ciclo > di 1 anno | 1 |
| Floricole a ciclo breve (< 3 mesi) | 0,3 |
| Altre floricole | 0,5 |

Tab. 19 Quota base di Azoto per le colture floricole a portamento arboreo (kg/ha)

| Coltura | Quota base |
|----------------|-------------------|
| Fronde | 80 |

ALLEGATO N° 3: SCHEDE COLTURA

INDICE

1. ROSA
2. RANUNCOLO
3. ASPARAGUS
4. MARGHERITA (in vaso)
5. CICLAMINO (in vaso)
6. CRISANTEMO (fiore reciso)
7. CRISANTEMO (in vaso)
8. PEPERONCINO ORNAMENTALE
9. PAPAVERO
10. RUSCUS
11. PITTOSPORO VARIEGATO
12. GINESTRA

SCHEDA COLTURA: ROSA

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>La rosa viene coltivata sia in serra che in pien'aria. Tollera un ampio intervallo di temperature (T°C estreme: -20° e +50° C), ma le temperature ottimali di coltivazione sono: 21-24° C di giorno e 15-16° C di notte. Nella fase di induzione a fiore, con temperature troppo basse, si può verificare un aborto dei germogli che porterà ad avere steli ciechi e mancate fioriture. Alla ripresa vegetativa necessita di un'umidità relativa di 80-85 %, che si può abbassare a 60-70 % nel periodo di fioritura.</p> <p>La luminosità ottimale risulta compresa tra 33.000 e 44.000 Lux.</p> <p>Predilige terreni ricchi di sostanza organica e un pH ottimale di 6,5 – 7.</p> |

SCHEDA COLTURA: RANUNCOLO

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>Si adatta bene a terreni con un pH compreso tra 6,5 – 7, con bassa salinità e ricchi di sostanza organica purché la sistemazione del terreno assicuri un rapido sgrondo delle acque piovane, quindi terreno sciolto dotato di buon drenaggio.</p> |

SCHEDA COLTURA: ASPARAGUS

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>ASPARAGUS MEDEOLOIDES E' una pianta che resiste ad abbassamenti termici fino a 1 – 2 gradi sotto lo zero con piante asciutte. Richiede l'impianto di ombreggiamento al 90 % (serra ombreggiata con vetro imbiancato), con luminosità ottimale di 6000 lux. Predilige terreni sabbiosi, permeabili a reazione neutra.</p> <p>ASPARAGUS PLUMOSUS Predilige terreni freschi, sciolti, poveri di calcare, profondi e molto permeabili in quanto teme i ristagni di umidità, ricchi di ferro con un pH di 5.5-6.5. È una pianta sciafila, pertanto necessita di ombreggio con reti al 60-75% per ottenere una luminosità compresa tra gli 11.000 e i 33.000 lux. La temperatura ottimale è di 18-20° C e l'umidità relativa intorno al 75 %.</p> |

SCHEDA COLTURA: MARGHERITA (in vaso)

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|---|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>La margherita allevata a cespuglio ha esigenze di pieno sole. L'alberello invece va ombreggiato nella fase di crescita ed allungamento della talea (la cosiddetta filatura).</p> <p>Le esigenze termiche della margherita risultano essere ottimali a temperature comprese tra 15 e 20 °C notturne e 20-25 C° diurne, ma possono sopportare bene temperature prossime allo 0 °C.</p> |

SCHEDA COLTURA: CICLAMINO (in vaso)

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>CICLAMINO A FIORE GRANDE Serie CONCERTO La varietà ha la caratteristica di essere un pò più resistente al caldo, e di conseguenza si adatta al clima ligure. La coltivazione avviene in serra e necessita di un ombreggio maggiore rispetto ad altre varietà, vengono utilizzate reti ombreggianti al 70% o dei prodotti schermanti spruzzati sulla serra. Il vantaggio di una serra fresca ma luminosa aumenta la precocità della fioritura. L'ombreggio serve esclusivamente fino a metà settembre poi va tolto.</p> <p>CICLAMINO A FIORE GRANDE Serie HALIOS Le varietà Halios hanno la caratteristica di essere più resistenti al caldo, e di conseguenza si adattano bene al clima ligure. La coltivazione avviene in serra con l'ausilio di una rete ombreggiante al 50% o con dei prodotti schermanti spruzzati sulla serra. Il vantaggio di una serra fresca ma luminosa aumenta la precocità della fioritura. L'ombreggio serve esclusivamente fino a metà settembre poi va tolto. Mentre come già accennato in precedenza le altre varietà necessitano di una maggiore schermatura.</p> <p>CICLAMINO A FIORE MEDIO La coltivazione viene fatta in serra con l'ausilio di una rete ombreggiante al 50% o con prodotti schermanti spruzzati sulla serra. E' importante che, durante la stagione estiva, la struttura di protezione non impedisca la circolazione dell'aria evitando così gli eccessi termici. Il vantaggio di una serra fresca ma luminosa comunque aumenta sia la compattezza sia la precocità della fioritura. L'ombreggio serve esclusivamente fino a metà settembre poi va rimosso.</p> |

SCHEDA COLTURA: CRISANTEMO (fiore reciso)

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p><i>Temperature:</i> temperature notturne di 16°C risultano ottimali per la maggior parte delle varietà coltivate. Le temperature diurne ideali sono comprese tra 18° e 24°C, evitando di superare i 30°C perché oltre questa temperatura si avrebbe una grossa incidenza di aborti fiorali (steli ciechi), anche in condizioni di giorno corto.</p> <p><i>Luce:</i> è una pianta a giorno corto ossia la formazione e lo sviluppo dei boccioli fiorali viene stimolata dai giorni brevi. Nel corso delle ore diurne l'illuminazione consente alle piante di svolgere l'attività di assimilazione e formazione di sostanze indispensabili per la fioritura, mentre nelle ore notturne, se la notte stessa è sufficientemente lunga, queste sostanze si trasformano in ormoni di fioritura. Tale trasformazione inizia dopo 5 ore di buio. Si comprende quindi perché la fioritura avviene in condizioni di giorno corto, mentre lo sviluppo vegetativo è stimolato da condizioni opposte. Nelle nuove varietà a fioritura naturale si deve prestare attenzione alle settimane di reazione per l'induzione a fiore. Se ad es. abbiamo una varietà che richiede 11 settimane di reazione dobbiamo oscurare a partire dal 13-15 agosto fino al momento d'inizio del giorno corto naturale (inferiore a 12 ore di luce).</p> <p><i>Terreno:</i> terreni di buona fertilità, ricchi di sostanza organica e di elementi nutritivi, con pH compreso tra 6 e 7. Evitare terreni compatti o scarsamente drenati. Per una migliore qualità del fiore non portare la salinità del terreno oltre i 1300 µs/cm.</p> |

SCHEDA COLTURA: CRISANTEMO (in vaso)

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|---|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>CRISANTEMO TRADIZIONALE, SETTEMBRINO E COREANO</p> <p>Il crisantemo è una pianta molto rustica e si adatta molto bene a diversi tipi di clima. Negli ultimi anni, dato l'aumento generale delle temperature e l'introduzione di nuove varietà, la coltivazione del crisantemo nella nostra Regione avviene anche sotto strutture protette con reti ombreggianti al 10/15 % che hanno anche una funzione protettiva anti-grandine</p> |

SCHEDA COLTURA: PEPERONCINO ORNAMENTALE

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | <p>Non presenta particolari esigenze di terreno, pH compreso tra 6,8 e 7,5. I suoli più adatti sono quelli di medio impasto, ma si utilizzano anche terreni argillosi o sciolti. In quelli argillosi-limosi soggetti a ristagni e compattamento, è preferibile effettuare lavorazioni profonde allo scopo di garantire un buon drenaggio e favorire lo sviluppo dell'apparato radicale. Teme il freddo ed esige posizioni soleggiate. In inverno è preferibile una sistemazione protetta e riscaldata. Le condizioni climatiche per la crescita delle peperette si verificano con temperature diurne di 26° C e notturne di 16 – 18° C. Al di sotto dei 15° C si osserva una riduzione dell'accrescimento che si blocca del tutto a 10° C.</p> |

SCHEDA COLTURA: PAPAVERO

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | La temperatura ottimale di coltivazione è 15-18° C, non conviene coltivare in serra perché le piante tenderebbero ad allungarsi. Il papavero preferisce terreni drenati, di medio impasto e con un pH di 6,8 -7. Per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno si consiglia l'uso di ammendanti quali torba e corteccia. |

SCHEDA COLTURA: RUSCUS

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|---|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | Pianta che resiste ad abbassamenti termici fino a 1 – 2 gradi sotto lo zero con piante asciutte. Predilige terreni di medio impasto permeabili a reazione neutra o sub - acida, tuttavia si adatta anche a terreni calcarei. Pianta prettamente sciafila, richiede un impianto di ombreggiamento con stuoie o reti ombreggianti, in modo da avere una luminosità compresa tra i 7.000- 9.000 Lux. |

SCHEDA COLTURA: PITTOSPORO VARIEGATO

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|--|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | Predilige terreni di medio impasto, a reazione neutra o sub- acida, si adatta a terreni calcarei. Sopporta temperature fino a –6 ° C, in estate il clima caldo e secco rallenta o blocca l'attività vegetativa. È una pianta rustica, vigorosa e piuttosto resistente alle malattie e non necessita di molte cure colturali. |

SCHEDA COLTURA: GINESTRA

| Parametro | INDICAZIONI AGRONOMICHE |
|--------------------------------|---|
| ESIGENZE PEDOCLIMATICHE | Predilige suoli ben drenati, leggeri e poco calcarei, ma si adatta bene a tutti i terreni. Ama il clima mite e poco piovoso. Per quanto riguarda la resistenza al freddo le varietà precoci risultano generalmente le più sensibili, mentre quelle tardive le più resistenti. |

Allegato n° 4

SCHEDE DOSE STANDARD**AZOTO**

La modalità semplificata di determinazione degli apporti di azoto prevede livelli "standard" di impiego dei fertilizzanti, calcolati ipotizzando alcune condizioni di riferimento come: rese produttive medio/alte, dotazione normale di sostanza organica nel suolo, piovosità non elevata e conseguenti perdite di azoto per lisciviazione contenute, ecc. .

L'entità dell'apporto standard viene definito utilizzando il metodo del bilancio.

Deve essere precisato l'aumento complessivo massimo ammesso che può essere anche inferiore alla somma di tutte le voci di incremento previste dalla scheda.

I parametri considerati per modificare le condizioni di riferimento e i rispettivi valori variano in funzione delle specie coltivate. Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riporta la struttura della scheda per le colture a portamento erbaceo e arboreo.

Esempio della struttura della Scheda per colture a portamento erbaceo

| Parametri | Dose Standard | Incrementi | | Decrementi | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Condizione | kg N/ha | Condizione | kg N/ha |
| Resa: | Medio/alta | + 20 % dello standard | (*) | - 20% dello standard | (*) |
| Tenore in S.O.: | Normale | Bassa | 20 | Alto | - 20 |
| Piovosità dal 1/10 al 31/1 | < = 300 mm | > 300 mm | 20 | | |
| Precessione: | | Cereale con Interramento Paglia | 20 | Leguminosa, sovescio | -20 |
| Apporto ammendanti | No | No | | Si | -20 |
| Data impianto | Normale | Anticipata | 10 | | |
| Tipo varietà | | Alto contenuto proteico | 20 | | |

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.

Esempio della struttura della Scheda per colture a portamento arboreo

| Parametri | Dose Standard | Incrementi | | Decrementi | |
|-------------------------------|----------------|---|-------|--|-------|
| | | Condizione | kg/ha | Condizione | kg/ha |
| Resa: | Medio/alta | + 20 % dello standard | (*) | - 20% dello standard | (*) |
| Tenore in S.O.: | Normale o alto | Bassa | 20 | | |
| Piovosità Dal 1/10 al 28/2 | < = 300 mm | > 300 mm | 20 | | |
| Apporto ammendanti | No | No | | Si | -20 |
| Sviluppo vegetativo | Equilibrato | Stentato: scarsa lunghezza dei germogli, mancato rinnovo del legno, fogliame pallido, scarso N fogliare | 20 | Eccessivo: presenza di succhioni, colore fogliame verde scuro colore frutti insufficiente | -20 |

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.

FOSFORO E POTASSIO

La struttura delle schede per il fosforo e il potassio è del tutto simile a quella descritta per l'azoto; l'unica differenza rilevante consiste nel fatto che l'apporto standard varia in relazione alla dotazione del terreno. In caso di dotazione elevata l'apporto è nullo. Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riporta un esempio per una coltura a portamento arboreo in produzione. Bisogna tenere presente che i valori numerici riportati sono indicativi e possono subire variazioni nelle schede specifiche.

Esempio di Scheda "DOSE STANDARD" per le colture a portamento arboreo

| | | |
|--|---|--|
| Quantitativo di P_2O_5 da sottrarre dalla dose standard. | Apporto di P_2O_5 in situazione normale per una produzione di 25 t/ha - Dose standard | Quantitativo di P_2O_5 che potrà essere aggiunto alla dose standard. |
| 10 kg con produzioni inferiori del 20% (**) | 40 kg /ha in situazione di normale dotazione del terreno | 10 kg con produzioni superiori del 20%(**) |
| 10 kg con apporto di ammendanti | 20 kg/ha in situazione di elevata dotazione del terreno 60 kg/ha in situazione di scarsa dotazione del terreno | 10 kg con basso tenore sostanza organica terreno |
| Quantitativo di K_2O da sottrarre dalla dose standard. | Apporto di K_2O in situazione normale per una produzione di 25 t/ha - Dose standard | Quantitativo di K_2O che potrà essere aggiunto alla dose standard. |
| 30 kg con produzioni inferiori del 30% (**) | 60 kg /ha in situazione di normale dotazione del terreno | 30 kg con produzioni superiori del 30% (**) |
| 30 kg con apporto di ammendanti | 30 kg/ha in situazione di elevata dotazione del terreno 90 kg/ha in situazione di scarsa dotazione del terreno | |

(**) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.

Di seguito si riportano le tabelle dei valori delle dotazioni di riferimento per le schede a dose standard.

| Legenda | Codice | Descrizione | Raggruppamento |
|---------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | S | Sabbioso | Tendenzialmente Sabbioso |
| 2 | SF | Sabbioso Franco | |
| 3 | L | Limoso | Franco |
| 4 | FS | Franco Sabbioso | Tendenzialmente Sabbioso |
| 5 | F | Franco | Franco |
| 6 | FL | Franco Limoso | |
| 7 | FSA | Franco Sabbioso Argilloso | |
| 8 | FA | Franco Argilloso | |
| 9 | FLA | Franco Limoso Argilloso | Tendenzialmente Argilloso |
| 10 | AS | Argilloso Sabbioso | |
| 11 | AL | Argilloso Limoso | |
| 12 | A | Argilloso | |

| Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Giudizio | Dotazione (x schede a dose standard) | Tendenzialmente Sabbiosi | Franco | Tendenzialmente Argillosi |
| molto bassa | bassa | <0,8 | < 1,0 | < 1,2 |
| bassa | normale | 0,8 – 1,4 | 1,0 – 1,8 | 1,2 – 2,2 |
| medio | | 1,5 – 2,0 | 1,9 – 2,5 | 2,3 – 3,0 |
| elevata | elevata | > 2,0 | > 2,5 | > 3,0 |

Fonte: SILPA modificato GTA

| Dotazioni di P assimilabile (ppm) | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| Giudizio | Dotazione (x schede a dose standard) | Valore P Olsen | Valore P Bray-Kurtz |
| molto basso | scarsa/scarsissima | <5 | <12,5 |
| basso | | 5-10 | 12,5-25 |
| medio | normale | 11-15 | 25,1-37,5 |
| elevato | | 16-30 | 37,6-75 |
| molto elevato | elevata | > 30 | >75 |

Fonte: SILPA modificato GTA

| Dotazioni di K scambiabile (ppm) nei terreni | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| Giudizio | Dotazione (x schede a dose standard) | Tendenzialmente Sabbiosi | Franco | Tendenzialmente Argillosi |
| molto basso | scarsa/scarsissima | <40 | <60 | <80 |
| basso | | 40-80 | 60-100 | 80-120 |
| medio | normale | 81-120 | 101-150 | 121-180 |
| elevato | elevata | > 120 | >150 | >180 |

Fonte: SILPA modificato GTA

INDICE SCHEDE-DOSE STANDARD (dosi espresse in kg/1000 mq per anno)

1. Asparagus plumosus
2. Crisantemo
3. Ginestra
4. Papavero
5. Peperoncino ornamentale
6. Pittosporo
7. Ranuncolo
8. Rosa (fiore reciso)
9. Ruscus

ASPARAGUS PLUMOSUS – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 250 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 40 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 250 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 250 steli/mq/anno |

ASPARAGUS PLUMOSUS – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 250 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 12 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 250 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni superiori a 250 steli/mq/anno |

ASPARAGUS PLUMOSUS – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 250 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 38 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 6 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 250 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 6 kg : se si prevedono produzioni superiori a 250 steli/mq/anno |

CRISANTEMO A STELO SINGOLO – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|---|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 14 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 38 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 6 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 14 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 6 kg : se si prevedono produzioni superiori a 14 steli/mq/anno |

CRISANTEMO A STELO SINGOLO – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 14 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 30 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 14 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 14 steli/mq/anno |

CRISANTEMO A STELO SINGOLO – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|--|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 14 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 59 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 9 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 14 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 9 kg : se si prevedono produzioni superiori a 14 steli/mq/anno |

GINESTRA – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 8 q.li/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 20 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 3 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 8 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 3 kg : se si prevedono produzioni superiori a 8 q.li/1000 mq/anno |

GINESTRA – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 8 q.li/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 20 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 3 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 8 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 3 kg : se si prevedono produzioni superiori a 8 q.li/1000 mq/anno |

GINESTRA – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 8 q.li/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 30 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 4,5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 8 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 4,5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 8 q.li/1000 mq/anno |

PAPAVERO – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 120 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 40 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 120 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 120 steli/mq/anno |

PAPAVERO – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 120 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 14 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 120 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni superiori a 120 steli/mq/anno |

PAPAVERO – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|---|--|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 120 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 50 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 120 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni superiori a 120 steli/mq/anno |

PEPERONCINO ORNAMENTALE – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 50 q.li/1000 mq DOSE STANDARD: 40 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 q.li/1000 mq/anno |

PEPERONCINO ORNAMENTALE – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 50 q.li/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 15 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 q.li/1000 mq/anno |

PEPERONCINO ORNAMENTALE – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|--|---|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 50 q.li/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 50 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 q.li/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 q.li/1000 mq/anno |

PITTOSPORO – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 7 quintali/1000 mq/anno DOSE STANDARD: V ANNO: 21 kg VI ANNO: 25 kg VII ANNO: 32 kg VIII ANNO: 35 kg | Note incrementi Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> V ANNO: 3 kg <input type="checkbox"/> VI ANNO: 4 kg <input type="checkbox"/> VII ANNO: 5 kg <input type="checkbox"/> VIII ANNO: 5 kg se si prevedono produzioni inferiori a 7 quintali/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> V ANNO: 3 kg <input type="checkbox"/> VI ANNO: 4 kg <input type="checkbox"/> VII ANNO: 5 kg <input type="checkbox"/> VIII ANNO: 5 kg se si prevedono produzioni superiori a 7 quintali/1000 mq/anno |

PITTOSPORO – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| <p align="center">Note decrementi</p> <p>Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard:</p> | <p>Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 7 quintali/1000 mq/anno</p> <p align="center">DOSE STANDARD:</p> <p align="center">V ANNO: 6 kg</p> <p align="center">VI ANNO: 7,5 kg</p> <p align="center">VII ANNO: 10 kg</p> <p align="center">VIII ANNO: 10,5 kg</p> | <p align="center">Note incrementi</p> <p>Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:</p> |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> V ANNO: 1 kg <input type="checkbox"/> VI ANNO: 1 kg <input type="checkbox"/> VII ANNO: 1,5 kg <input type="checkbox"/> VIII ANNO: 1,5 kg <p>se si prevedono produzioni inferiori a 7 quintali/1000 mq/anno</p> | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> V ANNO: 1 kg <input type="checkbox"/> VI ANNO: 1 kg <input type="checkbox"/> VII ANNO: 1,5 kg <input type="checkbox"/> VIII ANNO: 1,5 kg <p>se si prevedono produzioni superiori a 7 quintali/1000 mq/anno</p> |

PITTOSPORO – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| <p>Note decrementi</p> <p>Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard:</p> | <p>Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 7 quintali/1000 mq/anno</p> <p>DOSE STANDARD:</p> <p>V ANNO: 10,5 kg</p> <p>VI ANNO: 12,5 kg</p> <p>VII ANNO: 16 kg</p> <p>VIII ANNO: 17,5 kg</p> | <p>Note incrementi</p> <p>Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:</p> |
|---|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> V ANNO: 1,5 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VI ANNO: 2 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VII ANNO: 2,5 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VIII ANNO: 2,5 kg</p> <p>se si prevedono produzioni inferiori a 7 quintali/1000 mq/anno</p> | | <p><input type="checkbox"/> V ANNO: 1,5 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VI ANNO: 2 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VII ANNO: 2,5 kg</p> <p><input type="checkbox"/> VIII ANNO: 2,5 kg</p> <p>se si prevedono produzioni superiori a 7 quintali/1000 mq/anno</p> |

RANUNCOLO – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|---|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 45 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 27 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 4 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 45 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 4 kg : se si prevedono produzioni superiori a 45 steli/mq/anno |

RANUNCOLO – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 45 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 17 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 2,5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 45 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 2,5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 45 steli/mq/anno |

RANUNCOLO – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|--|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 45 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 30 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 45 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 45 steli/mq/anno |

ROSA (fiore reciso) – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|---|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 50 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 40 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 steli/ mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 steli/mq/anno |

ROSA (fiore reciso) – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|--|--|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 50 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 30 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 steli/mq/anno |

ROSA (fiore reciso) – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|--|---|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 50 steli/mq/anno DOSE STANDARD: 50 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 50 steli/mq/anno | | <input type="checkbox"/> 10 kg : se si prevedono produzioni superiori a 50 steli/mq/anno |

RUSCUS – CONCIMAZIONE AZOTO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|--|---|
| Quantitativo di N da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 9 quintali/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 10 kg | Quantitativo di N che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. |
| <input type="checkbox"/> 1,5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 9 quintali/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 1,5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 9 quintali/1000 mq/anno |

RUSCUS – CONCIMAZIONE FOSFORO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|--|---|
| Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 9 quintali/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 3 kg | Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 0,5 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 9 quintali/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 0,5 kg : se si prevedono produzioni superiori a 9 quintali/1000 mq/anno |

RUSCUS – CONCIMAZIONE POTASSIO per 1000 mq

| Note decrementi | | Note incrementi |
|---|---|---|
| Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: | Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 9 quintali/1000 mq/anno DOSE STANDARD: 12 kg | Quantitativo K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 9 quintali/1000 mq/anno | | <input type="checkbox"/> 2 kg : se si prevedono produzioni superiori a 9 quintali/1000 mq/anno |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

ALLEGATO N° 5 - DIFESA FITOSANITARIA NORME COMUNI E MODALITA' DI LETTURA DELLE SCHEDE DI DIFESA E DI CONTROLLO INFESTANTI

NORME COMUNI

La difesa integrata si sviluppa valorizzando prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori e allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente in un contesto di agricoltura sostenibile. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza. Quando sono possibili tecniche o strategie diverse occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di un'agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e all'applicazione dei principi generali indicati nell'allegato III della Direttiva n. 128/09/UE nonché di tutte le pertinenti prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN (Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei pesticidi).

In tal senso occorre:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari;
- favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l'adozione di tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
- limitare l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, (dispositivi di protezione individuale ecc.);
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le perdite per deriva;
- limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
- recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari e i relativi imballaggi;
- mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l'altro, di prevenire e gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.

Nelle schede di coltura sono state introdotte differenziazioni per quanto riguarda le colture in pieno campo e le colture protette (serre). In particolare, per serre e colture protette si intende quanto definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:

"«Serra» ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento esterno solitamente traslucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è traslucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia)." Ad esempio non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli tunnel mobili.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Qualora la gestione delle colture renda necessario adottare soluzioni diverse, sia nelle strategie di difesa che nella scelta dei prodotti, nelle schede sono state evidenziate tali differenze.

Nel caso in cui la gestione della coltura protetta o la destinazione delle produzioni (es. colture in serra, baby leaf, colture da seme) lo renda necessario sono state predisposte specifiche e differenti schede di difesa per la medesima specie. Sulla base di questi principi generali vengono proposte le strategie di difesa e di controllo integrato di seguito esposte.

In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura possono essere concesse deroghe di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale. Tali deroghe devono essere autorizzate dalla Regione con apposito provvedimento previa verifica che la situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere risolte adottando le strategie di difesa prevista dalle schede tecniche regionali. Le deroghe territoriali adottate dalle singole Regioni e PA devono essere tempestivamente trasmesse via e-mail a tutti i membri del GDI.

In caso di emergenze fitosanitarie definite dal Reg. (UE) 2016/2031 e dal Reg. (UE) 2019/2072 i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (Servizio Fitosanitario Nazionale e Regionale) hanno effetto immediato anche sull'applicazione delle Norme tecniche regionali, senza l'esigenza di ulteriori deroghe. L'uso dei fitoregolatori deve essere normato e regolamentato nel rispetto dei principi della produzione integrata ed è consentito ove dimostrata l'utilità e l'efficacia per il miglioramento della produzione. È ammesso solo l'uso delle sostanze attive presenti nelle specifiche schede.

Ove possibile, si dovrà consentire un'applicazione su scala territoriale dei monitoraggi e della produzione integrata.

I Disciplinari di Produzione Integrata si occupano di tutto l'utilizzo dei prodotti fitosanitari impiegati in azienda fatta eccezione per i trattamenti di post-raccolta. Il post raccolta deve intendersi così come definito all'articolo 3 del Reg.1107/2009, ossia correlato agli utilizzi sulle derrate. Le strategie trascritte nei disciplinari non sono da considerare, di fatto, solo per i casi di trattamenti effettuati in magazzino.

Per tutte le colture vengono adottate le misure di seguito riportate.

6.1 Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione

E' consentita la concia di tutte le sementi e il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente vietato.

6.2. Repellenti e Rodenticidi

6.2.1 Repellenti

E' consentito l'uso di "grasso di pecora" come repellente a cervi, daini, caprioli e camosci.

6.2.2 Rodenticidi

E' consentito l'impiego solo di rodenticidi regolarmente registrati per questo impiego.

6.3. Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

Nell'applicazione della difesa integrata devono essere privilegiati, ogniqualvolta possibile, i metodi non chimici di difesa fitosanitaria, così come prescritto dalla direttiva

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

2009/128/CE, ed indicati, avversità per avversità, nelle schede di coltura delle Norme tecniche.

Laddove questi metodi non risultassero sufficienti al contenimento delle avversità è consentito il ricorso all'utilizzo delle sostanze attive presenti nelle schede di coltura.

Tali sostanze attive sono state selezionate applicando specifici criteri di seguito riportati:

- eliminazione/limitazione, per quanto possibile, dei prodotti che contengono sostanze attive approvate a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per le quali il Decreto interministeriale del 7 novembre 2019 (attuazione della Direttiva UE n. 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 recante modifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati) prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 16 (vedi tabella 1);
- limitazione, per quanto possibile, dei prodotti che contengono sostanze attive chimiche approvate a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per le quali il citato Decreto interministeriale prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 8 (vedi tabella 1), selezionate secondo i seguenti criteri:
 - sostanze attive classificate pericolose per l'ambiente acquatico definite secondo quanto previsto:
 - ✓ dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e ss.mm.ii.
 - ✓ dal d. Lgs n. 152/06, tabelle 1A e 1B,
 - ✓ di frequente ritrovamento nelle acque (sulla base delle segnalazioni dei competenti organi regionali)
 - prodotti con indicazioni di pericolo relative ad effetti cronici sull'uomo che, secondo il sistema di classificazione CLP, sono:
 - H350i Può provocare il cancro se inalato,
 - H351 Sospettato di provocare il cancro;
 - H340 Può provocare alterazioni generiche;
 - H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
 - H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 - H360D Può nuocere al feto;
 - H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 - H360F Può nuocere alla fertilità.
 - H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 - H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
 - H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

- H361d Sospettato di nuocere al feto.
 - H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
 - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.
- limitazione, per quanto possibile, delle deroghe relative a prodotti che contengono sostanze attive non approvate a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 che sono autorizzate per emergenze fitosanitaria ai sensi dell'art.53 del Reg.n.1107/2009 per le quali il citato Decreto interministeriale prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 64 (vedi tabella 1);
- limitazioni alle s.a. contenute nei prodotti che sono caratterizzati dalla presenza sull'etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma "teschio con tibie incrociate" (corrispondente al pittogramma GHS06).

L'esclusione o la sostituzione di alcuni prodotti inclusi nella lista delle sostanze attive candidate alla sostituzione risultano particolarmente problematiche in considerazione dell'assenza di validi prodotti alternativi a base di sostanze a minore rischio. Nei casi in cui la loro inclusione nella lista dei candidati alla sostituzione dipenda da caratteristiche di tossicità, bioaccumulo e/o persistenza nell'ambiente (PBT), nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono considerate anche i seguenti parametri:

- estensione della coltura
- individuazione della coltura come "minore".

Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti un impiego minore, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. n. 1107/09, oppure interessi un'areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a minore rischio, è consentito il mantenimento di sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione della minore pressione che si determina sull'ambiente. Rientrano in tale casistica, ad esempio, numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti fitosanitari.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Tabella 1- Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1.

| Riga | Gruppi | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--|--|
| | 1* | | 2 | | 3** | | 4 |
| i) | Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 | | Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 | | Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 | | Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
| ii) | Categorie | | | | | | |
| iii) | A | B | C | D | E | F | G |
| iv) | Microrganismi | Sostanze attive chimiche | Microrganismi | Sostanze attive chimiche | Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini | Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini | |
| v) | Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 | | | | | | |
| vi) | 1 | | 8 | | 16 | | 64 |

* [link elenco sostanze a basso rischio](#)

** [link elenco candidati alla sostituzione](#)

6.4 Livello applicativo delle norme regionali di coltura

L'applicazione delle norme regionali di coltura è normalmente prevista a livello aziendale o per singola coltura. Nelle aree in cui la dimensione media degli appezzamenti è molto ridotta e l'attuazione è garantita da adeguati livelli di assistenza tecnica organizzata e di conoscenza del

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

territorio, forme associate di produttori possono subentrare all'agricoltore nell'applicazione dei disciplinari regionali. La Regione stabilirà le aree nelle quali tali modalità gestionali possono essere utilizzate.

6.5 Prodotti autorizzati in agricoltura biologica e sostanze di base

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15 luglio, a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura.

6.6 Sostanze di base

Possono essere utilizzate le sostanze di base a condizione che in etichetta sia riportata la dicitura "sostanza di base approvata ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1107/2009".

Link [elenco sostanze di base](#)

6.7 Smaltimento scorte

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore dei disciplinari regionali del nuovo anno o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nei disciplinari regionali nell'anno precedente.

6.8 Uso delle trappole

L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che tale indicazione è esplicitata nelle singole schede di coltura. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie non potranno richiedere nessuna deroga specifica. L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme tecniche regionali. Inoltre l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento.

Nelle tabelle seguenti si riportano alcune indicazioni di massima relative al numero di trappole utilizzabili in rapporto alla superficie da monitorare e sulla base delle esperienze tecniche regionali.

Trappole sessuali a feromoni

| Parassita | <= 1,5 ha * | > 1,6 a 3,5 ha | > 3,6 a 6,5 ha | > 6,6 a 10,5 ha | > 10,6 a 20 ha | Oltre |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Anarsia lineatella | 2 | 3 | 4 | 5 | n° ha /2 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Aonidiella aurantii | 2 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Archips podanus | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Argyrotaenia pulchellana | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Bractrocera oleae | 2 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Cryptoblabes gnidiella | 2 | 2 | 2 | 3 | n° ha /3 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Cydia funebrana | 2 | 3 | 4 | 5 | n° ha /2 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Cydia molesta | 2 | 3 | 4 | 5 | n° ha /2 | 1 ogni 10 ulteriori ha |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----------|------------------------|
| Cydia pomonella | 2 | 3 | 4 | 5 | n° ha /2 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Elateridi | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Lobesia botrana | 1 2 | 1 2 | 3 2 | 4 3 | n° ha /3 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Nottua gialla del pomodoro | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Pandemis cerasana | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Plutella xylostella | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /2 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Tignola patata | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Tuta assoluta pieno campo | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /4 | 1 ogni 10 ulteriori ha |
| Tuta assoluta coltura protetta | 1 ogni 3000 mq | | | | | |

Qualora si adotti il metodo della confusione sessuale si suggerisce, per la verifica del funzionamento di tale metodo, l'utilizzo di trappole super caricate, combo e alimentari.

Trappole cromotropiche

| Parassita | Tipologia | <= 1,5 ha* | > 1,6 a 3,5 ha | > 3,6 a 6,5 ha | >6,6 a 10,5 ha | Oltre |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Bactrocera oleae Mosca dell'olivo | a croce gialla (3) | 1 | 1 | 2 | 3 | n° ha /3 |
| Ceratitis capitata Mosca mediterranea | a croce gialla (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 |
| Drosophila suzukii | a croce rossa (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 |
| Rhagoletis cerasi Mosca ciliegio ++++ | a croce gialla (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 |
| Rhagoletis completa Mosca delle noci | a croce gialla (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 |
| Scaphoideus titanus | pannelli gialli | 1 | 2 | 3 | 4 | n° ha /3 |
| Tripidi per colture orticole | pannelli azzurri | 1 ogni 3000 mq | | | | |

(1) Attivazione con attrattivo alimentare o ammoniacale

(2) Attivazione con paraferomone

(3) Attivazione con attrattivo ammoniacale e feromone

(*) Quando l'estensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati in pieno campo, deve intendersi decaduta l'obbligatorietà delle trappole a condizione che venga effettuato il monitoraggio come previsto nelle schede di coltura.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

6.9 Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche devono sempre essere rispettate le indicazioni riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute vigente. Le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari con attività bagnanti, coadiuvanti, antideriva, antidoti agronomici, sinergizzanti, di norma non vengono indicate nelle schede di coltura. Il loro impiego è in ogni caso ammesso, sia come componente di un prodotto fitosanitario, sia come prodotto fitosanitario nel rispetto delle specifiche indicazioni di etichetta.

6.10 Disposizioni previste dall'art. 43 del D.L. 76/2020

Pur nella consapevolezza che i criteri alla base delle presenti strategie di difesa integrata sono finalizzate a garantire un corretto uso dei PF, si auspica il ricorso a modalità e tecnologie dell'agricoltura di precisione, al fine di assicurare il miglioramento continuo dei processi volti a razionalizzare l'uso dei PF e a ridurre ulteriormente le quantità impiegate. A tale riguardo si precisa che sono ammesse le modalità e le tecnologie dell'agricoltura di precisione riconducibili alla casistica riportata nelle presenti LGN, tenendo presente che qualora si dovesse incorrere nel mancato rispetto della prescrizione di etichetta che stabilisce la quantità minima d'impiego del PF riferita all'unità di superficie, gli operatori in regime SQNPI potranno avvalersi della deroga prevista dall'articolo 43, comma 7 quater del D. L. del 16 luglio 2020 n.76 convertito nella legge 120/2020. Si evidenzia che la suddetta deroga va riferita esclusivamente alla dose minima per unità di superficie, generalmente indicata in etichetta in kg o l di prodotto per ettaro, fermo restando la concentrazione della miscela (sempre conforme a quella espressamente indicata in etichetta in g/ml di prodotto per hl di acqua, oppure, se non indicata in etichetta, conforme a quella calcolabile sulla base dei volumi medi di bagnatura della coltura) e nel rispetto della dose massima per unità di superficie. Si sottolinea che la responsabilità in relazione all'uso dei PF è in capo all'utilizzatore. Al fine di favorire il buon esito di quanto premesso, garantendo al tempo stesso l'efficacia dei PF e la prevenzione di eventuali fenomeni di resistenza, si riportano le modalità d'uso dei PF rientranti nell'ambito della deroga di cui in premessa:

1. l'etichetta riporta la dose riferita sia all'ettaro (kg o l/ha) sia alla concentrazione della miscela fitoiatrica (g o ml/hl). Nell'esecuzione del trattamento si rispetta la dose a concentrazione adottando un volume di irrorazione adeguato alla fase fenologica (es. volumi più contenuti nelle prime fasi vegetative), alle forme di allevamento della coltura oggetto del trattamento ed ai volumi di irrorazione che possono rispondere anche a precise misurazioni tipo Leaf Wall Area.
2. il trattamento viene eseguito utilizzando macchine a recupero o altri dispositivi o attrezzature che determinano una riduzione del volume distribuito per unità di superficie irrorata.

Le suddette indicazioni si riferiscono essenzialmente alle specie coltivate in parete o comunque a sviluppo verticale dove le variabili dipendenti dalle caratteristiche dell'impianto (es. sesto d'impianto, altezza e spessore della chioma) sono in grado di determinare volumi di distribuzione ottimali molto diversi. Per le colture orticole, industriali o estensive la riduzione delle quantità di prodotto si ottengono essenzialmente attraverso la distribuzione localizzata. In questi casi la verifica della quantità di prodotto distribuita per ettaro deve essere riferita alla superficie effettivamente coinvolta. Ad es. in un trattamento localizzato sulle file che coinvolge un terzo della superficie complessiva dell'appezzamento, la verifica del rispetto della dose di

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

etichetta riferita all'ettaro come unità di superficie deve essere rapportata alla superficie effettivamente trattata e non a quella totale dell'appezzamento.

Lo stesso vale anche per i trattamenti parziali al terreno svolti sulle colture in parete o comunque a sviluppo verticale.

6.11 Contaminazioni accidentali

La presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari, si classifica come contaminazione accidentale, qualora riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0.01 mg/Kg così come stabilito al comma 1 lettera b dell'articolo 18 del Reg CE 396/2005.

6.12 Utilizzo del *Bacillus thuringiensis*

Al fine di ottimizzare l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis* in considerazione dell'efficacia dei diversi ceppi si consiglia di seguire le indicazioni riportate nelle tabelle 3a e 3b.

Modalità d'impiego

Premesso che il *Bacillus thuringiensis* agisce per ingestione ed esplica la sua attività insetticida principalmente nei confronti di larve nelle prime età di sviluppo è opportuno tener conto di quanto segue:

- Utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati;
- Assicurarci che la miscela utilizzata abbia un Ph non superiore a 6,5 acidificando eventualmente l'acqua in modo opportuno;
- Evitare di miscelare il prodotto con formulati a reazione alcalina;
- Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere.

Tabella 1. Elenco dei formulati a base di *Bacillus thuringiensis* con le relative principali caratteristiche

| Bacillus thuringiensis (Bt) sub-specie e ceppo | Prodotto Commerciale | Sostanza Attiva (percentuale in peso) | Attività (UI/mg di formulato) |
|---|-----------------------------|--|--|
| Bt ssp. kurstaki ceppo ABTS-351 | DIPEL DF | 54 | 32.000* |
| | BIOBIT DF | 54 | 32.000* |
| | BACTOSPEINE32WG | 54 | 32.000* |
| | BTK 32 WG | 54 | 32.000* |
| | ASTREL WDG | 54 | |
| | FORAY 76B | 18,44 | |
| | FORAY WG | 76,2 | 32.000* |
| | KRISTAL 32 WG | 54 | 32.000* |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | PRIMIAL WG SEQURA WG FORAY 48B | 54 54 12,65 | 32.000* |
| Bt ssp. kurstaki ceppo SA11 – sierotipo 3a,3b | DELFIN PRIMIAL | 6,4 6,4 | 53.000 US** 53.000 US** |
| Bt ssp. kurstaki ceppo SA12 | COSTAR WG | 18 | 90.000 |
| Bt ssp. kurstaki ceppo EG 2348 | BATKUR BOLAS SC LEPINOX PLUS RAPAX AS | 18,80 18,80 37,50 18,80 | 24.000* 24.000* 32.000* 24.000* |
| Bt ssp. kurstaki ceppo PB54 | BAC MK BACILLUS CHEMIA BELTHIRUL DOCTRIN LEPIBACK TURIBEL | 16 16 16 16 16 16 | 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 |
| Bt ssp. aizawai ceppo ABTS 1857 | FLORBAC WG XENTARI WG | 54 54 | 15.000* 15.000* |
| Bt ssp. kurstaki ed aizawai | TUREX AGREE | 50 50 | 25.000 25.000 |
| B.t. sub. aizawai ceppo GC91 | AGREE WG DESIGN WG | 50 50 | 25.000 25.000 |

* Attività in U.I./mg formulato su Trichoplusia ni.

** Attività pari a US/mg di prodotto. US: Unità Spodoptera basate su prove biologiche con Spodoptera exigua.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Tabella 2. Elenco delle specie di insetti nocivi registrati quali bersaglio di *Bacillus thuringiensis*

| SPECIE BERSAGLIO | CEPPI DI BACILLUS THURINGIENSIS | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Subsp. Kurstaki Ceppo ABTS 351 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA11 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA12 | Subsp. Kurstaki Ceppo EG2348 | Subsp. Kurstaki Ceppo PB54 | Subsp. Kurstaki + Subsp Aizawai | Subsp Aizawai Ceppo GC91 | Subsp Aizawai Ceppo ABTS 1857 |
| ORDINE <i>Lepidoptera</i> | | | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA <i>Gelechioidea</i> | | | | | | | | |
| <i>Anarsia lineatella</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Depressaria</i> spp | | + | + | | | + | + | |
| <i>Depressaria erinaceella</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Pectinophora gossypiella</i> | | | + | | + | + | + | |
| <i>Phthorimaea operculella</i> | + | + | + | + | | + | + | + |
| <i>Scrobipalpa ocellatella</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Tuta absoluta</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SUPERFAMIGLIA <i>Lasiocampoidea</i> | | | | | | | | |
| <i>Dendrolimus pini</i> | + | | | | | | | |
| <i>Dendrolimus superans</i> | + | | | | | | | |
| <i>Malacosoma neustria</i> | + | + | | + | + | | | |
| SUPERFAMIGLIA <i>Noctuoidea</i> | | | | | | | | |
| <i>Agrotis segetum</i> | + | | | + | | | | + |
| <i>Agrotis</i> spp. | | | | + | | | | |
| <i>Amphipyra</i> (<i>Amphipyra</i>) <i>pyramidea</i> | | | | + | | | | |
| <i>Autographa gamma</i> | + | + | + | | | + | + | + |
| <i>Chrysodeixis chalcites</i> | + | + | + | + | | | | + |
| <i>Euproctis chrysorrhoea</i> | + | + | | + | | | | |
| <i>Gortyna</i> spp. | | + | + | | | + | + | |
| <i>Gortyna xanthenes</i> | | + | | + | | | | |
| <i>Helicoverpa armigera</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| CEPPI DI BACILLUS THURINGIENSIS | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| SPECIE BERSAGLIO | Subsp. Kurstaki Ceppo ABTS 351 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA11 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA12 | Subsp. Kurstaki Ceppo EG2348 | Subsp. Kurstaki Ceppo PB54 | Subsp. Kurstaki + Subsp Aizawai | Subsp Aizawai Ceppo GC91 | Subsp Aizawai Ceppo ABTS 1857 |
| <i>Helicoverpa</i> spp. | + | + | | | + | | | |
| <i>Hyphantria cunea</i> | + | + | + | + | | + | + | + |
| <i>Lacanobia (Diataraxia)</i> (=Mamestra) oleracea | + | + | | + | | | | |
| <i>Leucoma salicis</i> | + | | | | | | | |
| <i>Lymantria dispar</i> | + | + | + | + | | + | + | |
| <i>Lymantria monaca</i> | + | | | + | | | | |
| <i>Lymantria</i> spp. | | | + | | | + | + | |
| <i>Mamestra brassicae</i> | + | + | + | + | | + | + | |
| <i>Mamestra</i> spp. | | + | | | | | | |
| <i>Mythimna unipuncta</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Orgyia (Orgyia) antiqua</i> | | | + | + | | + | + | |
| <i>Orgyia</i> spp. | | + | | | + | | | |
| <i>Orthosia (Orthosia) incerta</i> | | | + | | | + | + | |
| <i>Orthosia</i> spp. | | + | | | | | | |
| <i>Peridroma saucia</i> | | | + | | | + | + | |
| <i>Plusia</i> spp. | + | + | + | | + | | | + |
| <i>Spodoptera exigua</i> | + | | | + | | | | + |
| <i>Spodoptera littoralis</i> | | + | + | + | | + | + | + |
| <i>Spodoptera</i> spp. | + | + | + | | + | + | + | + |
| <i>Thaumetopoea pityocampa</i> | + | + | | + | | | | |
| <i>Thaumetopoea processionea</i> | + | | | + | | | | |
| <i>Thaumetopoea</i> spp. | | | + | | | + | + | |
| <i>Trichoplusia ni</i> | + | | | | | | | + |
| SUPERFAMIGLIA Pyraloidea | | | | | | | | |
| <i>Cryptoblabes gnidiella</i> | + | | + | | | | | |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| CEPPI DI BACILLUS THURINGIENSIS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| SPECIE BERSAGLIO | Subsp. Kurstaki Ceppo ABTS 351 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA11 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA12 | Subsp. Kurstaki Ceppo EG2348 | Subsp. Kurstaki Ceppo PB54 | Subsp. Kurstaki + Subsp Aizawai | Subsp Aizawai Ceppo GC91 | Subsp Aizawai Ceppo ABTS 1857 |
| <i>Duponchelia fovealis</i> | | + | | | | | | + |
| <i>Ephestia</i> spp. | | | | + | | | | |
| <i>Euzophera bigella</i> | | | | + | | | | |
| <i>Evergestis forficalis</i> | + | | | | | | | |
| <i>Ostrinia furnacalis</i> | + | | | | | | | |
| <i>Ostrinia nubilalis</i> | + | | + | + | | + | + | + |
| <i>Ostrinia</i> spp. | | + | + | | | + | + | |
| <i>Udea (=Phlyctaenia) rubigalis</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Zophodia grossulariella</i> | | + | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Tortricoidea | | | | | | | | |
| <i>Adoxophyes orana</i> | | + | + | + | | + | + | + |
| <i>Archips podana</i> | | + | | + | + | | | |
| <i>Archips rosana</i> | | | | | + | | | |
| <i>Archips</i> spp. | | | + | | | + | + | |
| <i>Argyrotaenia ljunghiana</i> | + | | + | + | + | + | + | + |
| <i>Argyrotaenia</i> spp. | | | | + | | | | |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i> | | | | | | + | + | |
| <i>Celypha lacunana</i> | | + | | | | | | |
| <i>Choristoneura lafauryana</i> | | | + | | | | | |
| <i>Choristoneura</i> spp. | + | | | | | | | |
| <i>Cnephasia</i> spp. | | + | | | | | | |
| <i>Cydia pomonella</i> | | + | + | | + | + | + | |
| <i>Cydia splendana</i> | | | + | | | | | |
| <i>Epichoristodes acerbella</i> | | | | | | + | + | |
| <i>Eupoecilia ambiguella</i> | | + | + | + | + | + | + | |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| CEPPI DI BACILLUS THURINGIENSIS | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| SPECIE BERSAGLIO | Subsp. Kurstaki Ceppo ABTS 351 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA11 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA12 | Subsp. Kurstaki Ceppo EG2348 | Subsp. Kurstaki Ceppo PB54 | Subsp. Kurstaki + Subsp Aizawai | Subsp Aizawai Ceppo GC91 | Subsp Aizawai Ceppo ABTS 1857 |
| <i>Grapholita (Aspila) funebrana</i> | | | + | | | + | + | |
| <i>Grapholita molesta</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Hedya nubiferana</i> | | + | | | | | | |
| <i>Lobesia botrana</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Pandemis cerasana</i> | + | | | + | | | | |
| <i>Pandemis heparana</i> | | + | | | | | | |
| <i>Pandemis spp.</i> | | | + | + | | + | + | + |
| <i>Rhyacionia buoliana</i> | | | | + | | | | |
| <i>Spilonota ocellana</i> | | + | | | | | | |
| <i>Tortrix spp.</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Tortrix viridana</i> | + | | | + | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Gracillarioidea | | | | | | | | |
| <i>Caloptilia roscipennella</i> | | + | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Yponomeutoidea | | | | | | | | |
| <i>Acrolepiopsis assectella</i> | | + | | | | | | + |
| <i>Plutella spp.</i> | | + | | | | | | |
| <i>Plutella xylostella</i> | + | | + | + | + | | | + |
| <i>Prays citri</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Prays oleae</i> | + | + | + | + | + | + | + | + |
| <i>Yponomeuta malinellus</i> | | | | | + | | | |
| <i>Yponomeuta padella</i> | | | + | + | | + | + | |
| <i>Yponomeuta spp.</i> | | | + | | | + | + | |
| SUPERFAMIGLIA Papilionoidea | | | | | | | | |
| <i>Pieris brassicae</i> | + | | | + | + | | | |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| CEPPI DI BACILLUS THURINGIENSIS | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| SPECIE BERSAGLIO | Subsp. Kurstaki Ceppo ABTS 351 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA11 | Subsp. Kurstaki Ceppo SA12 | Subsp. Kurstaki Ceppo EG2348 | Subsp. Kurstaki Ceppo PB54 | Subsp. Kurstaki + Subsp Aizawai | Subsp Aizawai Ceppo GC91 | Subsp Aizawai Ceppo ABTS 1857 |
| <i>Pieris rapae</i> | + | | | | | | | + |
| <i>Pieris</i> spp. | | + | + | | | + | + | |
| <i>Vanessa (=Cynthia) cardui</i> | + | + | | | | | | + |
| SUPERFAMIGLIA Adeloidea | | | | | | | | |
| <i>Lampronia (=Incurvaria) capitella</i> | | + | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Cossoidea | | | | | | | | |
| <i>Zeuzera pyrina</i> | | + | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Geometroidea | | | | | | | | |
| <i>Abraxas (Abraxas) grossulariata</i> | | + | | | | | | |
| <i>Erannis defoliaria</i> | | + | + | | | + | + | |
| <i>Operophtera brumata</i> | | + | + | + | | + | + | + |
| Geometridae | + | | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Zygaenoidea | | | | | | | | |
| <i>Aglaope infausta</i> | | | | | + | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| ORDINE Hymenoptera | | | | | | | | |
| SUPERFAMIGLIA Tenthredinoidea | | | | | | | | |
| <i>Craesus septentrionalis</i> | | + | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| ORDINE Thysanoptera | | | | | | | | |
| FAMIGLIA Phlaeothripidae | | | | | | | | |
| <i>Liothrips oleae</i> | | + | | | | | | |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

6.13 Utilizzo di Acaricidi

Nell'esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate nelle schede di coltura. Ad esempio con un limite di 1 trattamento all'anno è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella scheda di coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida +ovicida).

6.14 Utilizzo di sostanze microbiologiche

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di sostanze microbiologiche nella tabella n. 3 si riporta una sintesi degli insetti utili consigliati nelle norme di coltura.

Nella tabella n.4 si riporta una sintesi, non esaustiva, degli ausiliari consigliati impiegabili sulle diverse colture indicate, indipendentemente dal fatto che siano riportati nelle singole schede di coltura.

Tabella n. 3

| Microrganismi | Ceppo | Prodotto commerciale | Avversità |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Ampelomyces quisqualis | M-10 | AQ 10 WG | Funghi |
| Aureobasidium pullulans | DSM 14940 e DSM 14941 | AUREO SHIELD, BLOSSOM PROTECT NEW, BOTECTOR NEW, BOTECTOR ORTO | Funghi/Batteri |
| Bacillus amyloliquefaciens | Sottospecie plantarum, ceppo D747 | AMYLO-X, AMYLOX - LC | Funghi/Batteri |
| Bacillus amyloliquefaciens | MBI600 | SERIFEL | Funghi |
| Bacillus amyloliquefaciens | FZB24 | TAEGRO | Funghi |
| Bacillus firmus | I-1582 | VOTIVO | Nematodi in concia semente |
| Bacillus pumilus | QST 2808 | BALLAD, SONATA | Funghi |
| Bacillus subtilis | IAB/BS03 | MILDORÉ, PORTENTO, SEITYLIS, SUBELUS | Funghi |
| Bacillus subtilis* | QST 713 | DEFENSIS ORTO&GIARDINO, HARMONIX TURF, DEFENSE, RHAPSODY, SERENADE ASO, SERENADE MAX | Funghi/Batteri |
| Beauveria bassiana | GHA | BOTANIGARD 22WP BOTANIGARD OD | Insetti/Acari |
| Beauveria bassiana | ATCC 74040 | BOVERAL, BOVERAL OF, NATURALIS | Insetti/Acari |
| Beauveria bassiana | 147 | OSTRINIL TOP | Insetti/Acari |
| Beauveria bassiana | NPP111B005 | SERENISM | Insetti/Acari |
| Candida oleophila | O | NEXI | Funghi |
| Coniothyrium minitans | CON/M/91-08 | LALSTOP CONTANS WG | Funghi |
| Lecanicillium muscarium | Ve6 | MYCOTAL | Insetti |
| Metarhizium anisopliae | var. anisopliae BIPESCO 5 | GRANMET GR, BIPESCO 5 | Insetti |
| Metarhizium anisopliae | var. anisopliae F52 | LALGUARD MET 52 GR, LALGUARD MET52 OD | Insetti Insetti/acari |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| Metschnikowia fructicola | NRRL Y-27328 | NOLI | Funghi |
| Paecilomyces fumosoroseus | FE 9901 | FUTURECO NOFLY WP, SHARK PF | Insetti |
| Paecilomyces lilacinus | 251 | BIOACT PRIME DC, BIOACT WG | Nematodi |
| Pseudomonas chloroaphis | MA 342 | CERALL | Funghi in concia sementi |
| Pseudomonas sp. | DSMZ 13134 | PRORADIX, SYDERA, SYDERA PLUS | Funghi terricoli |
| Pythium oligandrum | M1 | POLYVERSUM | Funghi |
| Saccharomyces cerevisiae | LAS02 | SWOOSH | Funghi |
| Streptomyces | K61 | LALSTOP K61 WP | Funghi terricoli |
| Trichoderma asperellum | TV1 | BIOTRIX, PATRIOT GOLD, XEDAVIR | Funghi terricoli |
| Trichoderma asperellum | T34 | T34 BIOCONTROL | Funghi terricoli |
| Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii | ICC 012 + ICC 080 | BIOPRON, BIOTEN, ECOFOX, ECOFOX GOLD, RADIX SOIL, REMEDIER, TELLUS WP, VITANICA TC PROTECT | Funghi |
| Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride | T25 + T11 | TUSAL | Funghi |
| Trichoderma atroviride | SC1 | ESQUIVE WP, TRI-SOIL | Funghi |
| Trichoderma atroviride | I-1237 | ESQUIVE WP | Funghi |
| Trichoderma harzianum | ITEM 908 | AUGET WP | Funghi |
| Trichoderma harzianum | KRL-AG2 (T-22) | TRIANUM-G, TRIANUM-P | Funghi |
| Adoxophyes orana granulovirus | - | CAPEX 100 | Larve di capua (Adoxophyes orana) |
| Cydia pomonella granulovirus | Baculovirus (CpGV) | CARPO 600, CARPOSTOP, CARPOVIR, CARPOVIRUSINE PLUS, VIRGO | Carpocapsa (Cydia pomonella) e Tignola orientale del pesco (Grapholota molesta) |
| Cydia pomonella granulovirus | Baculovirus* ceppo R5 (CpGV-R5) | CARPOVIRUSINE EVO 2 | Carpocapsa (Cydia pomonella) e Tignola orientale Cydia molesta), Cidia del susino (Cydia funebrana) |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|
| Cydia pomonella granulovirus | CpGV | CYD-X, CYD-X-X-TRA, MADEX 100 | Carpocapsa (Cydia pomonella) e Tignola orientale del pesco (Grapholota molesta) |
| Cydia pomonella granulovirus | isolato V15 | MADEX TOP | Carpocapsa (Cydia pomonella) e Tignola orientale del pesco (Grapholota molesta) |
| Cydia pomonella granulovirus | isolato V22 | MADEX TWIN | Carpocapsa (Cydia pomonella) e Tignola orientale del pesco (Grapholota molesta) |
| Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus | isolato DSMZ BV-0003 | HELICOVEX | Nottua gialla (Helicoverpa armigera) |
| Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus | isolato DSMZ BV-0005 | LITTOVIR | Nottua mediterranea (Spodoptera littoralis) |
| Virus del mosaico del pepino isolato vc1 + Virus del mosaico del pepino isolato VX1 | VC1 + VX1 | V10 | Virus del mosaico del pepino |
| Virus del mosaico del pepino isolato VX1 | Ceppo CH2 isolato 1906 | PMV01 | Virus del mosaico del pepino |

* in base ai dati presenti nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute la sostanza attiva è Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) STR. QST 713, le etichette riportano Bacillus subtilis

** in base ai dati presenti nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute la sostanza attiva è Akanthomyces muscarius VE6 (formerly Lecanicillium muscarium STRAIN VE6), l'etichetta riporta Lecanicillium muscarium

*** in base ai dati presenti nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute la sostanza attiva è Metarhizium brunneum strain MA 43, le etichette riportano Metarhizium anisopliae

6.15. Miscele estemporanee (fungicidi)

Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi pack) non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; è ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

6.16 Miscele commerciali

All'interno delle schede colturali di difesa e di diserbo vengono riportate le singole sostanze attive (s.a.) senza trascrivere le miscele. E' possibile utilizzare le miscele commerciali purchè le singole s.a. in esse presenti siano tutte riportate nella scheda colturale e nelle specifiche avversità.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Tabella 4 - Nella tabella seguente si riportano alcuni degli ausiliari impiegabili.

| ausiliare | bersaglio | colture di applicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|------|----------------|---------|--------------|------------|------|-----------|------|--------|-------|-------------|------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|-------|----------|------|---|
| | | castagno | cetriolo | cetriolo seme | cicorino | cocomero | dolcetta | fragola C.P. | fragola P.C | kaki | Piccoli frutti | lattuga | lattuga seme | lattughino | mais | melanzana | melo | melone | olivo | Peperone CP | pero | Pomodoro mensa | prezzemolo | rucola | sedano | soia seme | zucca | zucchino | vite | |
| Amblyseius andersoni | ragnetti ed eriofidi | | X | X | | X | | X | X | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | X | |
| Amblyseius cucumeris | tripidi | | X | | | | | X | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | X | |
| Amblyseius swirskii | aleurodide/tripide | | X | | | X | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | | | | | X | X | |
| Anagirus pseudococci | Cocciniglie farinose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Anthocoris nemoralis | cacopsilla pyri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Aphidius colemani | afidi | | X | X | | X | | X | X | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | X | |
| Aphidoletes aphidimyza | afidi | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Chrysoperla carnea | afidi | | X | X | | | | X | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | X | | |
| C. montrouzieri | Cocciniglie farinose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Diglyphus isaea | Liriomyza spp. | | | | X | | X | | | | | X | | X | | X | | X | | | | X | X | X | | | | | | |
| Encarsia formosa | Trialeurodes vaporarium | | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| Eretmocerus eremicus | Trialeurodes + Bemisia | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | |
| Eretmocerus mundus | Bemisia tabaci | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| Macrolophus pygmaeus | aleurodidi e tuta absoluta | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| Opius concolor | mosca dell'olivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | X* | | | | | | | | | | | |
| Orius laevigatus | tripidi | | X | X | | | | X | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | |
| Orius majusculus | tripide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Phytoseiulus persimilis | ragnetto rosso | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | CP | X | X | X | X | | |

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

MODALITA' DI LETTURA DELLE SCHEDE DI DIFESA E DI CONTROLLO DEGLI INFESTANTI

DIFESA INTEGRATA

Le schede sono impostate con le seguenti modalità nelle colonne:

- Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico in latino, nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità normalmente diffuse in ambito nazionale e regionale.
- Criteri di intervento: vincoli: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si devono utilizzare.
- Criteri di intervento: consigli: per ciascuna avversità sono indicati i criteri raccomandati.
- Sostanza attiva: per ciascuna avversità vengono indicate le sostanze attive, le esche proteiche, i sistemi di disorientamento e di confusione sessuale che si possono usare.
- Bio: indica se la sostanza attiva è biologica.
- Pieno campo: viene indicato se è utilizzabile o meno in pieno campo.
- Coltura protetta: viene indicato se è utilizzabile o meno in coltura protetta
- Gruppo chimico e codice gruppo chimico: si riferisce al gruppo chimico cui appartiene la sostanza attiva corrispondente.
- Colonna (1): Numero massimo di interventi per singola sostanza attiva indipendentemente dall'avversità
- Colonna (2): Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità. Riguarda limitazioni d'uso complessive relative ad un gruppo di sostanze attive racchiuse con linee.
- Limitazioni d'uso e note riguarda ulteriori limitazioni da adottare.
- Limitazioni d'uso per avversità: indica ulteriori limitazioni d'uso da adottare per avversità

È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Sostanza attiva".

Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono state indicate nella tabella e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati prodotti fitosanitari pronti all'impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l'avversità.

Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali e, ove tecnicamente possibile, si utilizzeranno preferibilmente le dosi minori.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Controllo delle Infestanti

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità espresse nelle colonne:

- Epoca (ove presente in tabella): la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti consigliata (pre-semine, pre-emergenza della coltura, post emergenza, ecc...)
- Impianto(ove presente in tabella): indica il tipo di impianto
- Attività: indica il tipo di attività della sostanza attiva.
- Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la strategia di controllo.
- Sostanza attiva: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa da utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari.
- Note: indicazioni sull'uso delle sostanze attive indicate

La quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle schede di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva, a prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per l'utilizzo di formulati commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.

È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "sostanze attive".

Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro gli infestanti per le quali sono state indicate nella tabella. Possono essere impiegati prodotti pronti all'impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l'infestante.

Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali e, ove tecnicamente possibile, si utilizzeranno preferibilmente le dosi minori.

REGIONE LIGURIA - DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA

Elenco delle sostanze attive classificate come “Candidati alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni (ss.mm.ii)

Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione

Cypermotrina, Emamectina, Esfenvalerate, Etofenprox, Etoxazole, Lambda-Cyhalothrin, Metam potassium, Metam sodium, Methossifenozone, Oxamyl, Pirimicarb, Tebufenpyrad.

Diserbanti candidati alla sostituzione

Aclonifen, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Flufenacet, Halosulfuron metile, Imazamox, Lenacil, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxyfluorfen, Pendimethanil, Profoxydim, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, Tembotrione, Tri-allate.

Fungicidi e fitoregolatori candidati alla sostituzione

Benzovindiflupyr, Bromuconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Fludioxonil, Fluopicolide, Ipconazole, Metalaxyl, Metconazole, Paclobutrazolo, Prodotti rameici (Miscela Bordolese, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato tribasico), Tebuconazole e Ziram.

| AVVERSITA' | NOME LATINO | CRITERI DI INTERVENTO: vincoli | CRITERI DI INTERVENTO: consigli | Sostanza attiva | Bio | pieno campo | coltura protetta | Gruppo chimico | Codice gruppo chimico | (1) | (2) | (3) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|---|-----|-------------|---|---|-----------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| PERONOSPORA | <i>Phytophthora sp.; Peronospora sp.</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare le irrigazioni sopra chioma e gli eccessi idrici - evitare i repentini sbalzi termici - evitare gli impianti troppo fitti - evitare lo sgocciolamento dell'acqua di condensa (mediante impiego di sottotelo). <p><u>Interventi chimici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi. | Prodotti rameici | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| | | | | Cimoxanil | | | | Cianoacetammide- ossima | U | * | | | | | (*) Autorizzato solo su rosa | |
| | | | | Propamocarb | | | Carbammati | F4 | * | | | | | | | (*) Solo al terreno |
| | | | | Dimetomorf | | | Ammidi dell'acido carbossilico-CAA | H5 | * | | | | | | | (*) Autorizzato solo su gerbera e garofano contro <i>Phytophthora spp.</i> |
| | | | | <i>Bacillus AmyloliQUEfaciensis</i> | SI | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichiderema Asperellum</i> | SI | | Microbica | BM | 5 | | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | Microbica | BM | 5 | | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| MARCUMI BASALI E RADICALI | <i>Pythium sp.; Phytophthora sp.</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare i ristagni idrici - disinfettare il terreno/substrato con vapore o con la solarizzazione. <p><u>Interventi chimici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire in presenza di sintomi. | <i>Streptomyces griseoviridis</i> | SI | NO | | | | * | | | (*) Autorizzato su floreali e ornamentali senza limitazioni di specie | | | |
| | | | | <i>Trichoderma spp</i> | SI | | | Microbica | BM | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma harzianum</i> | SI | | | Microbica | BM | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichiderema Asperellum</i> | SI | | | Microbica | BM | 5 | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | | Microbica | BM | 5 | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| | | | | <i>Bacillus AmyloliQUEfaciensis</i> | SI | | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | | | | | | | |
| | | | | Dimetomorf | | | Ammidi dell'acido carbossilico-CAA | H5 | * | | | | | | | (*) Autorizzato solo su garofano e gerbera, contro <i>Phytophthora spp.</i> |
| | | | | Fosetil-Alluminio | | | Fosfonati | U | * | | | | | | | (*) Autorizzato solo su ornamentali |
| | | | | Metalaxil-M | | | Fenilammidi | A1 | 1* | | | | | | | (*) Per ciclo colturale |
| | | | | Propamocarb | | | Carbammati | F4 | * | | | | | | | (*) Solo al terreno |
| MARCUMI | <i>Sclerotinia sp.; Rhizoctonia sp.; Corticium sp.</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il drenaggio dei terreni/substrati, adottare adeguati piani d'irrigazione ed eseguire equilibrate concimazioni - non interrare troppo le piante/bulbi al trapianto e favorire l'arieggiamento degli impianti in colture protette - controllare l'umidità nella serra - distruggere le piante infette - disinfettare il terreno/substrato con il vapore o con la solarizzazione. <p><u>Interventi chimici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ai primi sintomi. | <i>Coniothyrium Minitans</i> | SI | | | | | * | | | (*) Ammesso solo contro <i>Sclerotinia</i> | | | |
| | | | | <i>Trichoderma spp</i> | SI | | | Microbica | BM | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma harzianum</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tolclofos-metile | | | AH-Fungicidi (idrocarburi aromatici) | F3 | 1* | | | | | | | (*) Per ciclo colturale, solo contro <i>Rhizoctonia</i> |
| | | | | <i>Bacillus AmyloliQUEfaciensis</i> | SI | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | | | | | | | | |
| | | | | Flutolanil | | | | | | | | | 1* | | | (*) Solo su garofano |
| | | | | <i>Trichiderema Asperellum</i> | SI | | Microbica | BM | 5 | | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | Microbica | BM | 5 | | | | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSARIOSI | <i>Fusarium spp.</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare le lesioni ai bulbi e ai tessuti basali delle piante - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente - adottare cultivar resistenti o tolleranti - distruggere le piante affette - disinfettare il terreno/substrato con il vapore o con la solarizzazione. | <i>Streptomyces griseoviridis</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma spp</i> | SI | | | Microbica | BM | | | | | | | |
| | | | | <i>Bacillus AmyloliQUEfaciensis</i> | SI | | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | | Microbica | BM | 5 | | | | | | Solo su floreali |
| TRACHEOMICOSI | <i>Verticillium sp; Phialophora sp.</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare le lesioni ai bulbi e ai tessuti basali delle piante - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato - ai sensi della normativa vigente - adottare cultivar resistenti o tolleranti - distruggere le piante affette - disinfettare il terreno/substrato con il vapore o con la solarizzazione. | <i>Streptomyces griseoviridis</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma spp</i> | SI | | | Microbica | BM | | | | | | | |
| | | | | <i>Bacillus AmyloliQUEfaciensis</i> | SI | | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OIDI | <i>Erysiphe sp.; Oidium chrisanthemi; Oidium tabaci</i> | | <p><u>Interventi agronomici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare le foglie ed i getti colpiti - effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. <p><u>Interventi chimici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - alla comparsa dei primi sintomi. | <i>Ampelomyces quisqualis</i> | SI | | | | | * | | | (*) Autorizzato solo su rosa | | | |
| | | | | <i>Bacillus subtilis</i> | SI | | | Microbici <i>Bacillus sp</i> | F6 | 6* | | | | | (*) Ornamentali e rose, pieno campo e serra. Massimo 6 trattamenti/ciclo colturale | |
| | | | | Zolfo | SI | | | Inorganici | M | | | | | | | |
| | | | | Bicarbonato di potassio | SI | | | | NC | * | | | | | | (*) Ammesso solo su rosa e colture floricole porta seme |
| | | | | Bupirimate | | | | Idrossi- (2-amino-) pirimidine | A2 | * | 2 | | | | | (*) Autorizzato solo su rosa. Massimo 2 trattamenti all'anno |
| | | | | Metrafenone | | NO | | Aril-fenil-chetone | U | | | | | | | |
| | | | | Difenoconazolo | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | * | | | | | | | (*) Autorizzato solo su rosa e garofano (**) Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | Penconazolo | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | | | | (**) Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | Tebuconazolo | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | | | | (**) Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | | | | | | | * | 3** | | | | | (*) Autorizzato solo su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio (**) Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | Tetraconazolo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Boscalid | | | | SDHI inibitori della Succinato deidrogenasi | C2 | | | | | | | |
| | | | | Pyraclostrobin | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | | | |
| | | | | Azoxystrobin | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | | | Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | | | * | 3 | | | | | | (*) Autorizzato solo su rosa | | | |
| | | | | Trifloxystrobin | | | | | | | | | | | | |

| AVVERSITA' | NOME LATINO | CRITERI DI INTERVENTO: vincoli | CRITERI DI INTERVENTO: consigli | Sostanza attiva | Bio | pieno campo | coltura protetta | Gruppo chimico | Codice gruppo chimico | (1) | (2) | (3) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|-----|-------------|------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|--|--|---------------------------------|---|
| RUGGINI | <i>(Phragmidium spp., Uromyces caryophyllinus)</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> - riscaldamento e ventilazione adeguati della serra - raccolta e distruzione delle foglie e dei rametti infetti - evitare che i tessuti restino bagnati per tempi prolungati. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi. | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| | | | | <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penconazolo | | | | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | (**) Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | Tebuconazolo | | | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | * | 3** | | | (*) Autorizzato solo su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio |
| | | | | Tetraconazolo | | | | | DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I | G1 | | | | | | Con gli IBE per ciclo colturale |
| | | | | Azoxystrobin Metiram | | | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | (*) Autorizzato solo su garofano |
| MUFFA GRIGIA | <i>Botrytis cinerea</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> - assicurare una buona aerazione della serra - evitare le irrigazioni a pioggia - evitare che i tessuti restino bagnati per tempi prolungati. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi. | <i>Pythium Oligandrum CEPPO M1</i> | SI | | | | | | * | | | (*) Per ornamentali | | |
| | | | | <i>Bacillus Amyloliqefaciensis</i> | SI | | | | Microbici Bacillus sp | F6 | | | | | | |
| | | | | Pirimetani | | | | | Aniliniopirimidine | D1 | * | | | | | (*) Autorizzato solo su ciclamino |
| | | | | Cyprodinil | | | | Aniliniopirimidine | D1 | 2* | | | | | | (*) Per ciclo colturale; autorizzato solo su floricole |
| | | | | Fludioxonil | | | | Fenilpirroli | E2 | 2* | | | | | | (*) Per ciclo colturale; autorizzato solo su floricole |
| | | | | Boscalid Pyraclostrobin Mepanipirim | | | | | | SDHI inibitori della Succinato deidrogenasi | C2 | | 3* | | | |
| ALTERNARIA SPP. | | | <u>Interventi agronomici:</u> - eliminare e distruggere i residui di piante infette. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire solo alla comparsa dei sintomi. | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTORIA SPP. | | | | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| CLADOSPORIUM SP. | | | | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| ANTRACNOSI | | | | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| CANCRO O CORINEO DEL CIPRESSO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TICCHIOLATURA | <i>(Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp.)</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> ai sensi della normativa fitosanitaria vigente - abbassare l'umidità relativa al di sotto dell'85%, mediante ventilazione e riscaldamento - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato - scegliere cultivar resistenti - evitare di bagnare le foglie con l'irrigazione - distruggere, per quanto possibile, le foglie infette in autunno. <u>Interventi chimici:</u> - alla comparsa delle prime macchie fogliari. | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |
| | | | | Azoxystrobin | | | | | Inibitori del chinone membrana esterna QOI | C3 | | | | | Con gli IBE per ciclo colturale | |
| PATOGENI TELLURICI | <i>Sclerotinia spp., Rhizoctonia solani</i> | <u>Interventi agronomici:</u> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti. | | <i>Bacillus Amyloliqefaciensis</i> | SI | | | Microbici Bacillus sp | F6 | * | | | (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni | | | |
| | | | | Metam-sodio | | | | | | | * | | | (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno, con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas | | |
| | | | | <i>Trichiderema Asperellum</i> | SI | | | | | BM | 5 | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi | |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | | | Microbica | BM | 5 | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi | |
| MORIA DELLE PIANTINE | <i>Pythium sp.</i> | <u>Interventi agronomici:</u> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti. | | <i>Bacillus Amyloliqefaciensis</i> | SI | | | Microbici Bacillus sp | F6 | * | | | (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni | | | |
| | | | | Metam-sodio | | | | | | * | | | | (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno, con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas | | |
| | | | | <i>Trichiderema Asperellum</i> | SI | | | | Microbica | BM | 5 | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi | |
| | | | | <i>Trichoderma Atroviride</i> | SI | | | | Microbica | BM | 5 | | | | Fiori recisi. Max 5 interventi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATTERIOSI | <i>Erwinia sp.; Pseudomonas sp.</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> - effettuare accurato drenaggio del terreno/substrato - effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate - in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore - impiegare materiale di propagazione sano o certificato. | <i>Prodotti rameici</i> | SI | | | Inorganici | M | | | | 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura. | | | |

| AVVERSITA' | NOME LATINO | CRITERI DI INTERVENTO: vincoli | CRITERI DI INTERVENTO: consigli | Sostanza attiva | Bio | pieno campo | cultura protetta | Gruppo chimico | Codice gruppo chimico | (1) | (2) | (3) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE | | | |
|---|--|---|--|---|-----|-------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|-----|---|--|
| VIROSI | CMV; LSV; TSWV | | <u>Interventi agronomici:</u> - impiego di materiale sano ed eliminazione piante infette. <u>Interventi chimici:</u> - lotta agli insetti vettori. | | | | | | | | | | | | | |
| AFIDI | <i>Aphis gossypii</i> ; <i>Macrosiphoniella chrysanthemi</i> ; <i>Macrosiphum</i> spp.; <i>Myzus</i> spp.; <i>Rhopalosiphum padi</i> | | <u>Interventi chimici:</u> - alla comparsa delle prime colonie. | <i>Aphidius colemani</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Lysiphlebus testaceipes</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | SI | | | | | | | | * | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | | | * | | | |
| | | | | <i>Azadiractina</i> | SI | | | | | Azadiractina | UN | | | | | |
| | | | | <i>Piretrine pure</i> | SI | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | <i>Maltodestrina</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cipermetrina | | | | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Esfenvalerate | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | 1 | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Tau-fluvalinate | | | | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Acetamiprid | | | | | | | Neonicotinoidi | 4 | 2 | | | (**) Per ciclo colturale |
| Flupyradifurone | | | | | NO | | Butenoidi | 4D | * | 2** | | (*) Autorizzato solo su bulbose da fiore | | | | |
| Sulfoxaflor | | | | | NO | | Sulfoximine | 4C | 2 | | | | | | | |
| TRIPIDI | <i>Thrips</i> spp.; <i>Heliothrips</i> spp.; <i>Frankliniella occidentalis</i> | <u>Interventi agronomici:</u> - installare trappole cromotropiche di colore azzurro. | <u>Interventi agronomici:</u> - distruzione dei residui colturali - eliminazione delle infestanti. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alle prime catture nelle trappole. | <i>Beauveria Bassiana</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Amblyseius Swirskii</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Azadiractina</i> | SI | | | | | Azadiractina | UN | | * | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Steinernema feltiae</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cytraniliprole | | | | | | Diamidi | 28 | | | | | |
| | | | | <i>Piretrine pure</i> | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | Cipermetrina | | | | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Tau-fluvalinate | | | | | NO | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | |
| | | | | Acetamiprid | | | | | | | Neonicotinoidi | 4 | 2 | 1* | | (*) Per ciclo colturale |
| | | | | Etifenprox | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Abamectina | | | | | | | Avermectine | 6 | | | | |
| | | | | <i>Spinosad</i> | SI | | | | | | Spinosine | 5 | 3* | | | (*) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali |
| | | | | Spinetoram | | | | | | | Spinosine | 5 | 2* | 3 | | (*) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali |
| | | | | <i>Lecanicillium muscarium</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| <i>Paecilomyces fumosoeroseus</i> | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEUROIDIDI | <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Trialeurodes vaporarum</i> | | <u>Interventi agronomici:</u> - installare trappole cromotropiche gialle. <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alle prime catture nelle trappole. | <i>Amblyseius Swirskii</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Encarsia</i> spp. | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Beauveria Bassiana</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Eretmocerus eremicus</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | SI | | | | | | | | * | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | | | * | | | |
| | | | | <i>Piretrine pure</i> | SI | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | <i>Maltodestrina</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Azadiractina</i> | SI | | | | | Azadiractina | UN | | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Acetamiprid | | | | | | | Neonicotinoidi | 4 | 2 | | | (**) Per ciclo colturale |
| | | | | Flupyradifurone | | | | | NO | | Butenoidi | 4D | 2* | 2** | | (*) Uso solo su piante ornamentali e da fiore; non ammesso su Bemisia tabaci |
| | | | | Sulfoxaflor | | | | | NO | | Sulfoximine | 4C | 2 | | | |
| Pyriproxyfen | | | | | | | Ossipiridine | 7 | | | | | | | | |
| <i>Lecanicillium muscarium</i> | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paecilomyces fumosoeroseus</i> | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICALINE | <i>Typhlocyba rosae</i> | <u>Interventi chimici:</u> - in vivaio, alla presenza - in serra, solo su forti infestazioni. | <u>Interventi agronomici:</u> - evitare le coltivazioni in areali umidi e vicino ad una ricca vegetazione spontanea. | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | * | | | | | |
| | | | | <i>Azadiractina</i> | SI | | | | Azadiractina | UN | | | | | | |
| | | | | <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| COCCINIGLIE | | <u>Interventi chimici:</u> - soglia di intervento: presenza. | <u>Interventi agronomici:</u> - eliminare con la potatura verde i rami maggiormente infestati. | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | SI | | | | | | * | | | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | | * | | | | |
| | | | | Pyriproxyfen | | | | | Ossipiridine | 7 | 1* | | | | (*) In pieno campo, 2 in serra | |
| PSILLE | | | <u>Interventi agronomici:</u> - non eccedere nelle concimazioni azotate. | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | * | | | | | | |
| | | | | <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | SI | | | | | | | | | | | |
| METCALFA | <i>Metcalfa pruinosa</i> | | <u>Interventi chimici:</u> - intervenire solo in caso di infestazioni in atto. | <i>Olio minerale</i> | SI | | | | | | * | | | | | |
| | | | | <i>Spinosad</i> | SI | | | | Spinosine | 5 | 3* | | | | Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità (*) Autorizzato solo su ornamentali, rosa, crisantemo, garofano gerbera | |
| | | | | | | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | 2* | | | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi | |
| | | | | Etifenprox | | | | | | | | | | | | |

| AVVERSITA' | NOME LATINO | CRITERI DI INTERVENTO: vincoli | CRITERI DI INTERVENTO: consigli | Sostanza attiva | Bio | pieno campo | cultura protetta | Gruppo chimico | Codice gruppo chimico | (1) | (2) | (3) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|---|---|---|---|-----|-------------|------------------------|------------------------|---|-----|-----|-----|--|
| TORTRICIDI | <i>Epichoristodes acerbella</i> | Installare trappole a feromoni. | Interventi agronomici: - eliminare i residui colturali - eliminare le erbe infestanti - utilizzare reti antinsetto. Campionamento: esaminare settimanalmente 200 germogli/1000mq di coltura. Interventi chimici: - intervenire dopo il picco di volo, al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati. | <i>Bacillus Thuringiensis</i> | SI | | | | | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Tau-fluvalinate | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | <i>Spinosad</i> | SI | | Spinosine | 5 | 3* | | | | (*) Ammesso solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali |
| | | | | Emamectina benzoato | | | | Avermectine | 6 | 2 | | | |
| BEGA O TORTRICE MEDITERRANEA DEL GAROFANO | <i>Cacoecimorpha pronubana</i> | Interventi agronomici: - eliminare i residui colturali - eliminare le erbe infestanti - utilizzare reti antinsetto. Campionamento: esaminare settimanalmente 200 germogli/1000mq di coltura. Interventi chimici: - intervenire dopo il picco di volo, al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati. | Interventi agronomici: - eliminare i residui colturali - eliminare le erbe infestanti - utilizzare reti antinsetto. Campionamento: esaminare settimanalmente 200 germogli/1000mq di coltura. Interventi chimici: - intervenire dopo il picco di volo, al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati. | <i>Bacillus Thuringiensis</i> | SI | | | | | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Tau-fluvalinate | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | <i>Spinosad</i> | SI | | Spinosine | 5 | 3* | | | | (*) Ammesso solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali |
| NOTTUE FOGLIARI | <i>(Agrotis spp., Spodoptera spp.)</i> | Disporre in serra trappole sessuali se disponibili in commercio. | Interventi chimici: - intervenire quando si è accertato il momento di massimo | <i>Bacillus Thuringiensis</i> | SI | | | | | | | | |
| | | | | Cyantraniliprole | | | | Diamidi | 28 | | | | |
| | | | | Etofenprox | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | Cipermetrina | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | Deltametrina | | | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| | | | | Tau-fluvalinate | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | | | | |
| <i>Spinosad</i> | si | | Spinosine | 5 | 3* | | | | (*) Ammesso solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali | | | | |
| Emamectina benzoato | | | Avermectine | 6 | 2* | | | | (*) Non ammesso contro Agrotis. | | | | |
| ELATERIDI | <i>Agriotes spp.</i> | | | Teflutrin | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | * | | | (*) Applicazioni localizzate al terreno |
| MAGGIOLINI | <i>Melolontha melolontha</i> | | | Lambda-Cialotrina | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | * | | | (*) Applicazioni localizzate al terreno |
| | | | | Teflutrin | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | * | | | (*) Applicazioni localizzate al terreno |
| | | | | Cipermetrina | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi, escluso il Teflutrin |
| | | | | Deltametrina | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | 2* | | | (*) Per ciclo colturale |
| OZIORRINCHI | | | Interventi biologici: - intervenire contro le larve nel terreno in autunno o in primavera. Interventi chimici: - intervenire solo sugli adulti nel periodo estivo alla comparsa delle prime mangiature fogliari nelle ore crepuscolari o notturne. | <i>Nematodi entomoparassiti: Heterorhabditis spp.</i> | si | | | | | | | | |
| | | | | Tau-fluvalinate | | | NO | Piretroidi e piretrine | 3 | | 2* | | (*) Per ciclo colturale con i Piretroidi |
| | | | | <i>Metarhizium anisopliae</i> | si | | | | | | | | |
| TENTREDINI | | Interventi chimici: - alla comparsa dei primi danni, ed eseguendo trattamenti, se possibile, localizzati. | Interventi agronomici: - asportazione e distruzione delle parti di pianta colpite. | | | | | | | | | | |
| LARVE MINATRICI | <i>Liriomyza sp.</i> | Installare trappole cromotropiche gialle. | Interventi chimici: - intervenire alle prime catture. | <i>Diglyphus Isaea</i> | si | | | | | | | | |
| | | | | <i>Azadiractina</i> | si | | | Azadiractina | UN | | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | si | | | | | * | | | |
| | | | | Cyantraniliprole | | | | Diamidi | 28 | | | | |
| | | | | <i>Spinosad</i> | si | | | Spinosine | 5 | 3* | | | (*) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali |
| SCIARIDI | <i>Lycoriella spp., Bradysia spp., Platosciaria spp.,</i> | | Interventi biologici: - intervenire contro le larve nel terreno - catture massali con trappole cromotropiche gialle. | <i>Nematodi entomoparassiti: Sternema feltiae</i> | si | | | | | | | | |
| CIMICE MARMORATA ASIATICA | <i>Halyomorpha halys</i> | | | <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> | si | | | | | | | | |
| | | | | Etifenprox | | | | Piretroidi e piretrine | 3 | 2 | | | |
| PUNTERUOLI | <i>Paysandisia archon, Rhynchophorus spp.</i> | | | <i>Nematodi entomopatogeni</i> | si | | | | | | | | |
| | | | | <i>Beauveria Bassiana</i> | si | | | | | | | | |
| | | | | Abamectina | | | | Avermectine | 6 | | | | |

| AVVERSITA' | NOME LATINO | CRITERI DI INTERVENTO: vincoli | CRITERI DI INTERVENTO: consigli | Sostanza attiva | Bio | pieno campo | coltura protetta | Gruppo chimico | Codice gruppo chimico | (1) | (2) | (3) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----|-------------|------------------|----------------|-----------------------|-----|-------------------------------|-----|---|---|--|--|--|
| ACARI | <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus spp.</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>) | | <u>Interventi chimici:</u> - intervenire alla presenza di infestazioni. | <i>Phytoseiulus Persimilis</i> | si | | | | | | | | Al massimo 4 interventi all'anno contro questo fitofago | | | | |
| | | | | <i>Amblyseius Californicus</i> | si | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Beauveria Bassiana</i> | si | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | si | | | | | | | | | * | | | |
| | | | | Maltodestrine | si | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Olio minerale</i> | si | | | | | | | | | * | | | |
| | | | | Clofentezina | | | | | | | Clofentezina | 10 | | | | | Solo su ornamentali in serre permanenti |
| | | | | Etoxazole | | | | | NO | | Ettoxazole | 10 | | | | | |
| | | | | Exitiazox | | | | | | | Exitiazox | 10 | | | | | |
| | | | | Bifenazate | | | | | | | bifenazate | 20 | | | | | |
| | | | | Abamectina | | | | | | | Avermectine | 6 | | 1 | | | |
| | | | | Fenazaquin | | | | | | | METI acaricidi ed insetticidi | 21 | | * | | | (*) Autorizzato solo su crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali |
| | | | | Fenproxiimate | | | | | | | METI acaricidi ed insetticidi | 21 | | | | | |
| | | | | Pyridaben | | | | | | | METI acaricidi ed insetticidi | 21 | | * | | | (*) Autorizzato solo su rosa, garofano, crisantemo |
| | | | | Zolfo | | | | | SI | | Inorganici | M | | | | | |
| Milbectina | | | | | | NO | | Milbemicine | 6 | * | | | (*) Per floreali e ornamentali nel limite degli interventi previsti per gli acari | | | | |
| Cyflumetofen | | | | | | NO | | Cyflumetofen | | | | | | | | | |
| NEMATODI | <i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>Pratylenchus spp.</i>) | | <u>Interventi agronomici:</u> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato - disinfezione con vapore e solarizzazione. | <i>Paecilomyces lilacinus</i> | si | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE | | | <u>Interventi chimici:</u> - alla comparsa delle prime piante infestate. | <i>Phasmarabbits hermafrodita</i> | si | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Metaldeide esca | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Fosfato ferrico</i> | si | | | | | | | | | | | | |
| ALTRO | | | | Fosfuro di zinco | | | | | | | | | | | | | |

Controllo Integrato delle infestanti delle Colture Floricole ed Ornamentali

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | Note |
|--|---------------------------|---|--|
| Pre semina Pre trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | Glifosate (*) Acido Pelargonico Carfentrazone (1) | (*) (1) solo per vivai di piante arbustive e arboree |
| Post trapianto | Dicotiledoni e Graminacee | Pendimetalin (2) (**) Isoxaben (2) Oxyfluorfen (3) (**) | (2) Ammesso solo su Ornamentali (3) Ammesso solo su vivai ornamentali (3) Ammesso solo con applicazioni in bande lungo le file nel periodo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio |
| Pre emergenza | Graminacee | Isoxaben (4)(*) | (4) Ammesso solo su alberi e arbusti in vivaio o pieno campo e su rosa in pieno campo. Max 1 intervento. (*) Nel limite del 30% della superficie colturale |
| Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno con film plastici biodegradabili | | | |
| (**) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione: 2. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi). | | | |
| (*) limite aziendale del glifosate su colture non arboree: ogni azienda per singolo anno (1 gennaio-31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ettaro. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2l x n° di ha è il massimo disponibile per l'uso sulle specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture. | | | |

ALLEGATO N. 8 – OBBLIGHI CONNESSI CON IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI FITOSANITARI, ALL’IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E ALLO SMALTIMENTO DELLE CONFEZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI

La regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve obbligatoriamente essere effettuata presso i Centri Prova all’uopo autorizzati. In ogni caso, la regolazione strumentale deve essere sempre abbinata e preceduta dal controllo funzionale.

I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell’ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Durante le operazioni di regolazione strumentale della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale e, preferibilmente, della trattrice che viene normalmente utilizzata dall’azienda per i trattamenti, in quanto ciò:

- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell’ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- rappresenta un momento di confronto con l’utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l’occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

Al termine delle operazioni di regolazione strumentale, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un attestato di regolazione nel quale vengono riportati: il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.

Le regolazioni strumentali effettuate presso i Centri Prova hanno una validità di 3 anni.

1. GESTIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI

L’attrezzatura deve essere regolarmente sottoposta ad una adeguata pulizia per garantire il mantenimento del corretto funzionamento e per evitare imbrattamenti accidentali di persone, animali e cose e deve essere accuratamente bonificata in ogni sua parte ogni qualvolta ci sia il rischio di possibili contaminazioni con sostanze attive non ammesse dal piano di protezione per la coltura che ci si accinge a trattare.

Si rimanda a quanto stabilito dal Decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”

A.7.3.3 - Le aziende agricole

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

1. rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;
2. effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo A.3.7.

A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria)

1. La regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve obbligatoriamente essere effettuata presso i Centri Prova all'uopo autorizzati. In ogni caso, la regolazione strumentale deve essere sempre abbinata e preceduta dal controllo funzionale.

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
 - tipo di ugello;
 - portata dell'ugello;
 - portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
 - pressione di esercizio;
 - altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
 - velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).
2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
3. Durante le operazioni di regolazione strumentale della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale e, preferibilmente, della trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti, in quanto ciò:
- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
 - rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.
4. Al termine delle operazioni di regolazione strumentale, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un attestato di regolazione nel quale vengono riportati: il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.
5. Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 3 anni.

2. CORRETTO IMPIEGO

La preparazione della miscela e lo smaltimento dei residui del trattamento e delle acque di lavaggio dovrà essere effettuata con la massima attenzione a non determinare inquinamenti puntiformi di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Può essere opportuno gestire lo smaltimento aziendale dei residui di trattamento e di lavaggio attraverso vasche attrezzate per la raccolta e/o sistemi bio-bed. L'esecuzione dei trattamenti dovrà avvenire nel rispetto delle precauzioni operative orientate alla minimizzazione degli effetti deriva, ad esempio, trattare in assenza di vento, mantenere adeguata distanza da corpi idrici dalle strade e dalle abitazioni.

3. IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In merito all'impiego di dispositivi di protezione individuale(DPI) in tutte le fasi operative, dal prelievo del prodotto fitosanitario (PF) fino allo smaltimento del residuo di miscela, il personale addetto alla preparazione e alla distribuzione delle miscele deve operare nel rispetto delle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei singoli prodotti fitosanitari impiegati, adottando adeguate protezioni a difesa dei rischi derivanti da assorbimento cutaneo, contaminazione oculare, assorbimento per inalazione e orale.

I DPI (tute, stivali, guanti ecc.) devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e conservati in luogo separato rispetto ai PF. I filtri per maschere e cabine pressurizzate vanno periodicamente sostituiti con frequenza proporzionata al periodo d'uso.

ELENCO PRINCIPALI AVVERSITA'/COLTURE FLORICOLE

| COLTURA | AVVERSITA' | |
|-------------------|-------------------------|---|
| ANEMONE | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, Marciumi basali e radicali, Marciumi, Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Antracnosi, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, Clorosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Larve minatrici, Tortricidi, Nottue fogliari, Nematodi, ... |
| ARALIA | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Antracnosi, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, maculature, Mosaici, |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Nottue fogliari, Oziorrinco, Acari, ... |
| ASPARAGUS | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Fusariosi, Muffa grigia, Antracnosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Tortricidi, Nottue fogliari, Acari, ... |
| CALENDULA | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Alternariosi, Cercosporiosi, |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Tortricidi, Nottue fogliari, Larve minatrici, ... |
| CALLA | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Oidio, Antracnosi, Ticchiolatura, |
| | BATTERIOSI | Marciume putrido del rizoma |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Tortricidi, Nottue fogliari, Acari, Nematodi, ... |
| CICLAMINO | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Muffa grigia, Septoriosi, Antracnosi, ... |
| | BATTERIOSI | Marciume molle, Avvizzimento batterico, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Nottue fogliari Oziorrinco, Sciaridi, Acari, ... |
| CRISANTEMO | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Septoriosi, Antracnosi, Ascochitosi, ... |
| | BATTERIOSI | Avvizzimento batterico, Tumore batterico, ... |
| | VIOSI | Da agenti di Avvizzimenti, Mosaici, Necrosi, Clorosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Tortricidi, Nottue fogliari, Larve minatrici, Acari, Nematodi, ... |
| EUCALYPTUS | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Oidio, Alternariosi, Cancri del legno |
| | FITOFAGI | Afidi, Psilla, ... |
| GERANIO | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Ruggine, Muffa grigia, Alternariosi, ... |
| | BATTERIOSI | Marciume batterico, Tumore batterico, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Decolorazioni, Avvizzimenti, Maculature, |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Tortricidi, Nottue fogliari, Sciaridi, Acari... |
| GINESTRA | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Oidio, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Larve minatrici, Agrilo, |

| COLTURA | AVVERSITA' | |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| MARGHERITA | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, , Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Oidio, Ruggine, Alternariosi, Antracnosi, |
| | BATTERIOSI | Tumore batterico, Avvizzimento batterico, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, Maculature |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cicaline, Larve minatrici, Lepidotteri, Nematodi, ... |
| MIMOSA | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Psilla, |
| ORTENSIA | MALATTIE FUNGINE | Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Septoriosi, Antracnosi, |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, Clorosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Acari... |
| PAPAVERO | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Oidio, Muffa grigia, Elmintosporiosi ,... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, ... |
| | FITOFAGI | Tripidi, Tortricidi, Nottue fogliari ... |
| PEPERONCINO ORNAMENTALE | MALATTIE FUNGINE | Tracheomicosi, Oidio, Muffa grigia, Alternariosi, Antracnosi, Mal bianco, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Necrosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Larve minatrici, Acari, ... |
| PITTOSPORO | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Tracheomicosi, Alternariosi, Antracnosi, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Maculature, Nanismo, Mosaici, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Cocciniglie, Cimici, Acari, ... |
| RANUNCOLO | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, Marciumi basali e radicali, Fusariosi, Tracheomicosi, Oidio, Muffa grigia, Antracnosi, ... |
| | BATTERIOSI | Marciume fogliare, ... |
| | VIOSI | Da agenti di : Avvizzimenti, Mosaici, Giallumi, Maculature, Decolorazioni, Deformazioni, |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Tortricidi, Nottue, Larve minatrici, Nematodi, ... |
| ROSA | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, Tracheomicosi, Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Antracnosi, Ticchiolatura, Seccumi e Cancri dell'innesto, , ... |
| | BATTERIOSI | Tumore batterico |
| | VIOSI | Da agenti di: Mosaico, Clorosi, Arabescature, Maculatura, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Tortricidi, Tentredini, Acari, Nematodi, |
| RUSCUS | MALATTIE FUNGINE | Marciumi basali e radicali, Marciumi, Fusariosi, Muffa grigia, Antracnosi, ... |
| | VIOSI | Da agenti di: Mosaici, Clorosi, Necrosi, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Cicaline, Tortricidi, Nottue fogliari, Oziorrinco, Acari, Nematodi, ... |
| STATICE | MALATTIE FUNGINE | Peronospora, Marciumi, Tracheomicosi, Oidio, Ruggine, Muffa grigia, Antracnosi, |
| | VIOSI | Da agenti di: Avvizzimenti, Mosaici, Clorosi, Maculature, ... |
| | FITOFAGI | Afidi, Tripidi, Nottue fogliari, Acari, ... |