

ALLEGATO N.1

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Pero	Ticchiolatura	Thiram		Da limitare a 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Melo	Afidi, cocciniglia	Spyrotetramat		Inserire limitazione: impiegabile solo in post fioritura.
Pesco	Maculatura batterica			Modificare denominazione avversità (Cancro o maculatura batterica) e il nome scientifico (inserendo il sinonimo X. Arboricola pv. Pruni)
Vite	Peronospora		Propineb	Aggiungere alla nota: non ammesso in fioritura
Ribes	Oidio		Penconazolo	Da limitare solo al pieno campo
Ribes	Botrite		Boscalid+Pyraclostrobin	Aggiungere alla nota: da limitare solo al pieno campo
Mirtillo	Botrite		Boscalid+Pyraclostrobin	Da limitare solo al pieno campo e con un massimo di 2 interventi all'anno
Lampone, Rovo	Botrite		Boscalid+Pyraclostrobin	Aggiungere alla nota: da limitare solo al pieno campo
Fragola-post impianto	Fitoftora		Metalaxyl-M	Non autorizzato in questa fase
Cavoli a infiorescenza	Nottue e cavolaia e tignola		Clorantraniliprole (da solo e in miscela con Lambdacialotrina)	Non ammesso in coltura protetta
Cavoli a foglia	Mamestra		Indoxacarb	Non ammessa contro questa avversità
Cavoli a testa	Nottue	Metaflumizone		Togliere dalla nota "non ammesso su cavolo verza"
Basilico	Marciumi molli			Sostituire Botrytis squamosa con B. Cinerea
Sedano	Mosche		Teflutrin	Non autorizzato contro questa avversità
Sedano	Nottue terricole (Agrotis)	Teflutrin		Inserire su questa avversità e, essendo utilizzato al terreno, non va posto in alternativa agli altri piretroidi
Spinacio	Nottue fogliari			Inserita anche Mamestra brassicace
Melone	Peronospora		Ametoctradin+Dimetomorf	Da limitare solo al pieno campo
Melone	Aleurodidi		Pyryproxyfen	Non ammesso sulla coltura
Melanzana	Patogeni tellurici		Dazomet	Impiegabile una volta ogni 3 anni. Impiegabile prima della semina e/o al trapianto.
Melanzana	Varie		Pymetrozine	Ammesso solo in serra al massimo 2 interventi all'anno e solo se si lanciano insetti utili

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Peperone	Tignola del pomodoro		Metaflumizone	Ammesso solo in serra
Pomodoro pc e cp	Septoriosi		Zoxamide	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro cp	Cladosporiosi	Propineb		
Pomodoro cp	Septoriosi		Azoxystrobin	Non autorizzato contro questa avversità
Pomodoro cp	Marciumi da Pythium		Propamocarb+Fosetil Al	Precisare che può essere utilizzato solo con impianti a goccia o con distribuzione localizzata
Floricole	Tutte		Flufenoxuron	Prodotto revocato
Floricole e ornamentali (crisantemo, gerbera, garofano, ornamentali)	Acari	Fenazaquin		In alternativa e nei limiti previsti per gli altri acaricidi
Floricole	Liriomyza		Bacillus Thuringiensis	Non autorizzato contro questa avversità
Floricole	Cetonia		Piretro	Non autorizzato contro questa avversità
Cavolo rapa	Marciumi basali	Tricoderma asperellum	Tricoderma viride	Aggiungere anche autorizzato solo contro Rhizoctonia
Patata	Tignola	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cavoli a infiorescenza pc, cavoli a testa pc, cavoli a foglia pc	Nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Pisello pc	Mamestra, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Fagiolo pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Fagiolino pc	Nottue fogliari, tripidi, afidi, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cipolla pc	Nottue, tripidi, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Scalognolo pc	tripidi, afidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Cetriolo pc e cp	Nottue fogliari, afidi, aleurodidi	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Mais	Nottue, diabrotica, piralide	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Erba medica	Apion, fitonomo	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Floreali e ornamentali	Afidi, tripidi, aleurodidi, tortricidi e bega, nottue fogliari, maggiolino	Betacyflutrin		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi e comunque non più di 3 all'anno
Pomodoro pc	Afidi, aleurodidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Floreali	Afidi	Esfenvalerate		In alternativa e alle condizioni già previste per l'impiego dei piretroidi
Patata	Tignola	Thiacloprid		Al massimo 1 intervento all'anno
Patata	Peronospora	Almisulbron		Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide
Melone cp, Cocomero cp	Ragnetto rosso e aleurodidi	Spyromesifen		Nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno
Zucca cp	Ragnetto rosso	Spyromesifen		Nei limiti previsti per gli acaricidi e comunque non più di 2 interventi all'anno

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Pesco	Bolla, batteri osi, corineo, fusicocco, cancri rameali	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Albicocco	Corineo, nerune, apiognomonina, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Susino	Ruggine, corineo, nerune delle drupacee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Ciliegio	Corineo, nebbia o seccume delle drupacee, batteriosi	Prodotti rameici		Impiegabili per i trattamenti in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno
Melo	Carpocapsa, cydia molesta, zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Pero	Carpocapsa, cydia molesta, zeuzera pyrina	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Pesco	Cydia molesta	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno e nei limiti previsti per i regolatori di crescita
Susino	Cydia funebrana	Triflumuron		Al massimo 2 interventi all'anno
Sorgo	Diserbo pre emergenza	Terbutilazina (25%)+Pendimetalin (5.9%)		Alla dose di 2.5 l/ha
Rucola pc	Myzus persicae e Na sonovia ribisnigri	Spyrotetramat		Al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenoziide		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Pomodoro, Peperone e spinacio	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi in serra e 1 in pieno campo
Albicocco e Pesco	Anarsia	Metoxifenozone		Al massimo 2 interventi all'anno
Melo, Pero	Varie		Metoxifenozone	Limitare a 3 all'anno
Lattuga, Cicoria, Rucola, erbe fresche, prezzemolo, bietole da costa, basilico, sedano, finocchio tutte in pieno campo	Nottue (Heliothis e Spodoptera)	Metoxifenozone		Al massimo 1 intervento all'anno
Ciliegio	Rhagoletis cerasi	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi e comunque non più di 2 interventi con questa s.a.
Albicocco, Susino, Pesco	Ceratitis capitata	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Agrumi	Calocoris trivialis, ceratitis capitata, Phyllocnistis citrella	Acetamiprid		Nei limiti previsti per i neonicotinoidi sulla coltura
Cocomero pc	Peronospora	Ametotractina+Metiram		Al massimo 2 all'anno e nei limiti previsti per i ditiocarbammati sulla coltura
Pesco	Tripidi	Formentanate		Al massimo 1 intervento all'anno in alternativa e nel numero complessivo previsto per gli esteri fosforici
Tutte le colture in cui è inserito	Patogeni tellurici		Metam Na e Metam K	La limitazione all'impiego una volta ogni 3 anni va rinviata al 31/12/2014
Cavolo a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo)	Alternariosi e Peronospora	IBE		Per colture con cicli superiori a 120 gg con raccolta primaverile aumentare da 2 a 3 gli interventi
Cavolo rapa e cavolo a foglia	Varie	Lambdacialotrina		In alternativa e nei limiti previsti per i piretroidi
Pomodoro cp	Muffa grigia allo stelo	Imazalil		Per formulati spray eliminare vincolo dei 2 trattamenti all'anno

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATIVA DI INSERIRE	SOSTANZA ATTIVA DA ESCLUDERE O DA LIMITARE	NOTE E LIMITAZIONI
Fragola pre e post impianto, ripresa vegetativa e pre raccolta pieno campo	Vaiolatura	Dodina		
Tutte le coltura orticole escluso lo spinacio	Varie		Dodina	Utilizzo revocato